

SACER - SAN "CELSUS"

TABLETES ELIXIR

Combinació a dosis adequades i atòxiques de Bromur sòdic, Lumina i Calci

*De positius resultats
en el tractament de:*

Epilèpsia

Eclàmpsia

Corea

Paràlisi agitant

Mal de cap

Neurastènia

Histerisme

Insomni nerviós

Manies agudes

MILLORA ELS CASOS MES REBELS

(Propaganda exclusivament mèdica)

KATGUT KALMERID

Catgut incomparablement superior al CATGUT IODAT

El CATGUT KALMERID (bullible i no bullible) es deu vegades més germicida que el *Catgut iodat*, té un coeficient de tensió un 16 % superior al del *Catgut iodat*, no és tòxic ni irritant per els teixits, no s'altera per la acció del temps ni de la llum, és reabsorbit amb regularitat.

CATGUT KALMERID ràpidament absorbible i de 10, 20 ó 40 dies de període de reabsorció.

AGULLES ATRAUMATIQUES per a *sutures gastro-intestinals*. Porten Catgut Kalmerid bullible de 20 dies.

Tubs d'una agulla recta, dues agulles rectes, una agulla corba de $\frac{3}{8}$, ó de $\frac{1}{2}$ circumferència.

TENDONS DE CANGUR, SEDES i tota mena de *sutures quirúrgiques*

DAVIS & GECK, INC.

211 a 221, Duffield Street - Brooklyn
N. Y., U. S. A.

Dr. FRANCESC PUIG SUREDA

Passeig de Sant Joan, 53 - BARCELONA

EUZYMINA MENARINI

**Solució titulada de
Lecitina i ferments digestius**

Fórmula del Proff. CONCETT, de Roma

Recomenada en les malalties de l'aparell digestiu dels nens

L'**Euzymina**, pels ferments que conté associats a la lecitina, no solament reemplaça les deficiències de l'aparell digestiu, sinó que estimula les forces zimògenes per a major activitat funcional.

DOSIS: Per a nens de pit, 10 a 20 gotes després d'haver pres el pit; per a nens de 2 anys o més, 20 a 30 gotes després de cada àpat; per adults, una culleradeta de cafè.

Mostres gratis als senyors metges que les sol·licitin als senyors

J. URIACH I C.^a, S. A. : APARTAT 632 : BARCELONA