

REUMATISMES DIATÈSICS I TÒXICS (AGUTS I CRÒNICS)

No n'hi ha prou, en el tractament del Reumatisme, amb la desintegració i eliminació de les acumulacions uràtiques, i menys encara amb la mitigació del dolor; és indispensable per a guarir, modificar essencialment el metabolisme reumàtic.

DIATURASA (INJECTABLE, CAPSULINES, GRANULAT I BALSAM)

INJECTABLE

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'20; Solfe orgànic, 0'05; Eter bencil-morruic, 0'60; Oli neutre etericamforat, a l'1 %
Q. S. per una ampolla de 5 cc.

CAPSULINES

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'10; Eter bencil-morruic, 0'095; Solfe orgànic, 0'005, per capsulina de 0,20 gr.

GRANULAT

Eter ianlicicònic-metilic, 0'80; Sulfosalicilat de formina, 0'80; Nucleotinosat IIIc, 0'25; Metilarinat sòdic, 0'025; Sals etervecents, edulcorant i aromàtics, Q. S. per una dosi de 5 gr. (cullerada plena)

BÀLSAM

Eter salicil-benzo-bencílic, 25; Hidrat de terpillen, 10; Càmbora, 5; Mentol, 2; Essències aromàtiques, 2; Oli d'*Hyoscyamus niger* compost, Q. S. per un total de 100 grams de producte.

HEUS ACÍ UN PAS GEGANTÍ DE MÀXIMA EFICÈNCIA EN LA TERAPÈUTICA CURATIVA DE LA URICÈMIA

Prescribeixi's l'**injectable** (intramuscular) 2, 3 dies per setmana, o bé diàriament, segons la intensitat del cas, i conjuntament indiqui's l'ús del **granulat** i aleshores haurà fet el metge una veritable tasca guaritiva del Reumatisme. Reservi's les **capsulines** per a substituir l'injectable en els períodes de descans i en aquells casos en què la intransigència del pacient el refusi; i el **bàlsam** (extern) com el calmant del dolor de més positiva eficàcia.

Reumatisme, Gota, Obesitat, Litiasis, Dermatitis diatèsiques, Arterioesclerosis, Artritis amb totes llurs conseqüències, i en general tot trastorn provocat i sostingut per una intoxicació uràtica, són les indicacions de la nostra
DIATURASA

DEMANI'S LITERATURA I MOSTRES PER EXPERIMENTACIÓ

LABORATORIS CERA, S. A. VICO, 18, I COPÈRNIC, 35 AL 39
BARCELONA