

REUMATISMES DIATÈSICS I TÒXICS (AGUTS I CRÒNICS)

No n'hi ha prou, en el tractament del Reumatisme, amb la desintegració i eliminació de les acumulacions uràtiques, i menys encara amb la mitigació del dolor; és indispensable per a guarir, modificar essencialment el metabolisme reumàtic.

DIATURASA

(INJECTABLE, CAPSULINES, GRANULAT I BALSAM)

INJECTABLE

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'20; Sofre orgànic, 0'05; Eter bençil-morruic, 0'50; Oli neutro etericamforat, a l'1 %, Q. S. per una ampolla de 5 cc.

GRANULAT

Eter fànilincònic-metílic, 0'30; Sulfosalicilat de formina, 0'30; Nucleotinofosfat litic, 0'25; Mètilaralinal àcid, 0'025; Bals olorós, adolcorant i aromàtica, Q. S. per una dosi de 5 gr. (culleradeta plena)

CAPSULINES

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'10; Eter bençil-morruic, 0'05; Sofre orgànic, 0'005, per capsulina de 0,20 gr.

BALSAM

Eter salicil-benzo-bencílic, 25; Hidrat de ferriol, 10; Càmfora, 5; Menta, 2; Essències aromàtiques, 2; Oli d'*Myoscyamus niger* compost, Q. S. per un total de 100 grams de producte.

HEUS ACÍ UN PAS GEGANTÍ DE MÀXIMA EFICÈNCIA EN LA TERAPÈUTICA CURATIVA DE LA URICÈMIA

Prescribeixi's l'**injectable** (intramuscular) 2, 3 dies per setmana, o bé diàriament, segons la intensitat del cas, i conjuntament indiqui's l'**ús del granulat** i aleshores haurà fet el metge una veritable tasca guaridiva del Reumatisme. Reservi's les **capsulines** per a substituir l'**injectable** en els períodes de descans i en aquells casos en què la intransigència del pacient el refusi; i el **balsam** (extern) com el calmant del dolor de més positiva eficàcia.

Reumatisme, Gota, Obesitat, Litiasis, Dermatoses diatètiques, Arterioesclerosis, Artritisme amb totes llurs conseqüències, i en general tot trastorn provocat i sostingut per una intoxicació uràtica, són les indicacions de la nostra

DIATURASA

DEMANI'S LITERATURA I MOSTRES PER EXPERIMENTACIÓ

LABORATORIS CERA, S. A.

VICO, 18, I COPÉRNIC, 35 AL 39
BARCELONA