

nuevo proceder de autoplastia del que va á tratar y del cual está altamente satisfecho. De estos presentará tres que están curados; los restantes se hallan en buenas condiciones para el restablecimiento.

El procedimiento consiste en ejecutar una incisión longitudinal súpero-anterior á todo lo largo del conducto, haciendo que penetre hasta el mismo pabellón, el cual debe seccionarse hasta la proximidad de la periferie de la *incisura auris*, ó el *surcus auris* anterior, ó sea entre la raíz del hélix en la concha y el borde superior del trago ó del tuber supratrágnico si existe. En este espacio no hay cartílago y el corte queda perfectamente disimulado entre los dos relieves. La sección debe ser tal que no alcance la cara externa de la incisura trago-helicina aunque á ella se aproxime mucho, quedando agrandada de esta manera la entrada del conducto auditivo externo hasta poder introducir por ella fácilmente toda la primera falange del dedo índice. Esta maniobra es muy fácil de ejecutar, tanto en niños como en adultos; es aplicable á todos los casos, deja una abertura más que suficiente para poder vigilar todos los recodos de la cavidad auricular; permite curar por ella al operado y hace que á las dos semanas se pueda cerrar definitivamente toda la incisión operatoria. Esta, en efecto, no debe cerrarse después de la operación, siendo preferible, como lo hace, aplicar uno ó dos puntos de sutura en sus extremos superior é inferior, taponando la cavidad auricular por el conducto y por la abertura central que resta entre los puntos suturados. De esta manera, el conducto membranoso seccionado se aplica sobre la pared posterior del conducto óseo separado; no hay temor á trayectos fistulosos, y, si conviene, podemos, antes de transcurridos los quince días, colocar en el centro de la incisión dos ó tres puntos desutura, curando entonces exclusivamente el enfermo por el conducto, sin temor alguno á la estenosis ulterior de éste, como acontece más de una vez con los otros procederes. En cuanto á la estética, como podrá observarse en los enfermos presentes, la enorme abertura del conducto queda perfectamente disimulada por el trago y hay que querer fijarse