

Itemost

MENORRAGIES, METRORAGIES, FIBROMES UTERINS, CONGESTIONS UTERO-OVARIQUES, HEMORRAGIES DE LA PUBERTAT I MENOPAUSA

Manera d'usar-lo i dosi diària

Prengum-se al començament dels àpats — amb una mica d'aigua i sense mastegar — de dues a vuit gragees el dia (dues cada vegada)



Demandin-se mostres per
Laboratori López-Brea -

ONO

Compositi	<table><tr><td>Substància mamària</td><td>0.10</td></tr><tr><td>Substància placentària</td><td>0.05</td></tr><tr><td>Secale cornutum extr.</td><td>0.06</td></tr><tr><td>Hamamelis virg. extr.</td><td>0.04</td></tr><tr><td>Hidraestis capad. extr.</td><td>0.02</td></tr></table>	Substància mamària	0.10	Substància placentària	0.05	Secale cornutum extr.	0.06	Hamamelis virg. extr.	0.04	Hidraestis capad. extr.	0.02
Substància mamària	0.10										
Substància placentària	0.05										
Secale cornutum extr.	0.06										
Hamamelis virg. extr.	0.04										
Hidraestis capad. extr.	0.02										



a experimentació clínica:
- Lleó XIII, 7 - Barcelona