

BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat boric sódic al 50%

EPILEPSIA

INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

El BOROSAL substitueix amb gran avantatge la medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni acnés medicamentosos), en entorpiment cerebral. El BOROSAL no és una medicació pal·liativa. El BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèl·lules nervioses obra sobre la causa i arriba a guarir radicalment l'Epilepsia essencial alleujant sempre la simptomàtica de qual sevol origen. El BOROSAL és, en el seu gè



nere el primer i més caracteritzat dels específics nacionals i per no tenir en absolut bromurs en cap classe de narcòtics, no té parió entre els existents. El BOROSAL és tan eficaç i ràpid com inofensiu i sempre ben tolerat, àdhuc pels nens.

NEURASTENIA, HISTERISME, NEURALGIES, COREA, ESPASMES, INSOMNIS, NOIS IRRITABLES i en general tote els casos de ERETISME NERVIOS

DOSIS

D'1 a 3 culleradetes de café, dues vegades al dia, després de menjar, amb aigua conucrada, segons les instruccions del prospecte i el parer del metge. Registrat a la Inspeció General de Sanitat amb el número 3,817 el 31 d'octubre del 1929

Nou mètode citofilàctic MAGNESTYL GELART

Profilaxi del Crane

MAGNESTYL fa desaparèixer lesions precanceroses
Sense lesions precanceroses no hi ha cranc

INDICACIONS DE MAGNESTYL:

Lesions precanceroses - Papil·lomes - Psoriasis - Berruges - Tumors - Furónculs - Antrax - Dermatitis - Plurits - Ulcères - Eczemes - Infecció de les vies biliars - Autointoxicacions intestinals

Us intern: Dues culleradetes (10 c. c.) pel mati en dejú

Us extern: Quatre culleradetes (20 c. c.) en 250 c. c. d'aigua

MOSTRES I LITERATURA:

LABORATORIS GELART: Menéndez-Pelayo, 53 : BARCELONA

PROPAGANDA EXCLUSIVAMENT MEDICA