


# BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat bórico sódic al 50%

## EPILEPSIA

## INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

El BOROSAL substitueix amb gran avantatge la medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni acnés medicamentosos), en antorpiament cerebral. El BOROSAL no és na medicació pal·liativa. El BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèl·lules nervioses obra sobre la causa i arriba a guarir radicalment l'Epilèpsia essencial alleujant sempre la simptomàtica de qual sevol origen. El BOROSAL és, en el seu gè



nere el primer i més caracteritzat dels específics nacionals i per no tenir el absolut bromurs en cap classe de narcòtics, no té parió entre els existents. El BOROSAL és tan eficaç i ràpid com Inofeusu i sempre ben tolerat, àdhuc pels nens.

NEURASTENIA, HISTERISME, NEURALGIES, COREA, ESPASMES, INSOMNIS, NOIS IRRITABLES i en general tots els casos de ERETISME NERVIOS

### DOSIS

D'1 a 3 culleradetes de café, dues vegades al dia, després de menjar, amb alguna emacurada, segons les instruccions del prospecte i el parer del metge. Registrat a la Inspecció General de Sanitat amb el número 3,817 el 31 d'octubre del 1923

## Nou mètode citofilàctic MAGNESTYL GELART

Profilaxi del Cranc

MAGNESTYL fa desaparèixer lesions precanceroses  
Sense lesions precanceroses no hi ha cranc

### INDICACIONS DE MAGNESTYL:

Lesions precanceroses - Papil·lomes - Psoriasis - Berruges - Tumors - Furónculs - Antrax - Dermatitis - Pluritis - Ulceres - Eczemes - Infeccions de les vies biliars - Autointoxicacions intestinals

*Us intern: Dues culleradetes (10 c. c.) pel matí en dejú*

*Us extern: Quatre culleradetes (20 c. c.) en 250 c. c. d'aigua*

MOSTRES I LITERATURA:

LABORATORIS GELART: Menéndez-Pelayo, 53 : BARCELONA

PROPAGANDA EXCLUSIVAMENT MEDICA