



JEMALT WANDER

Oli de Fetge de Bacallà maltejat en pols

Sense gust ni consistència oliosa

Totes les indicacions del oli de fetge de bacallà

Dr. A. Wander S. A., Berna (Suïssa)

Representant: J. Balari.-Ballón, 95 i 97.-Barcelona

BRONQUIOLINA SIRERA

Medicació específica de les malalties del pit

No és càustic i no irrita l'estómac

Comp.: Thiocol, clor-heroïna, benz-amònic,
xerop brea, tolú i saba de pi

F. Sirera i Pont - Bruc, 64 - Barcelona

Xarop antiepilèptic de F. Urgell (FÓRMULA DEL DR. BAYÉS)

La medicació clàssica de l' **EPILEPCIA**

FORMULA: Per cullerada de xarop
tro. agr. 16 48 grams. Brom. potàsic
3'50 grs. Brom. zinc 0'02 centig.

Excel·lents resultats en la gran majoria d'aleccions
nervioses (Corea, Histerisme, Convulsions, Neuro-
sis, etc., etc.) Puresa de components - Tolerància
màxima.

DE VENDA EN FARMACIES

I CENTRES D'ESPECIFICS

NOU PRODUCTE WASSERMANN

GADIL CALCIC WASSERMANN

(sense iode)

en injectables d'1 c. c. per a nens; de 2 c. c.
per a adults; de 5 c. c. per a teràpia intensiva.

Fórmula per injectable d'1 c. c.: 0'65 grs. d'oli de fetge
de bacallà, 0'10 d'ol at càlcic, 0'05 resines de pi, 0'10 leciti-
na, 0'10 guaiacol, 0'10 eucaliptol i 0'05 de mentol

Potent medicació per a: formes pretubercu-
loses i tubercloses, raquitisme, depaupera-
cions, trastorns neuro-vegetatius, decal-
cificacions.

ALTRES PRODUCTES WASSERMANN

Gadil Wassermann (amb iode)
Iodes Wassermann
Diarsen-lodes Wassermann
Lecitina i Colesterina Wassermann
Valero-Fosfer Wassermann
Aspasmol Wassermann
Lacto-Fosfer Wassermann
Atussol Wassermann

A. WASSERMANN, S. A.

Barcelona

:::

Foment, 63



RAQUITISME
ESCROFULISME
NEURASTENIA
TUBERCULOSIS

El millor reforçament
per a infants i per a
dones embaras-
sades i que criïn

OPOBYL

Insuficiències hepàtica i biliar, Hepatítis, Icterícia,
Colocistítis, Litiasis biliar, Entero-Colítis, Estrenyiment
crònic. Dispèpsia gastro intestinal

COMPOSICIÓ: Extractes hepàtica Sals bilars
Boldo i Combretum Rhamnus Podofilit i Evonimina

DOSI: Una o dues càpsules al començament o
a l'acabament dels menjars, dos o tres cops al dia

LABORATORIS A. BAILLY

Dipòsit general per a Espanya

J. UPIACH I C.
BARCELONA