

L'extracte original
del lòbul posterior
de la hipòfisis.



LA Pituitrina fou introduïda a la professió mèdica l'any 1908. No té qui la iguali, no solament respecte a la uniformitat, sino que també amb relació a l'estabilitat i puresa.

PITUITRINA

P., D. & Co.

INDICACIONS:

INÈRCIA uterina, retenció de la placenta, hemorràgia ginecològica, shock, col-lapse, asma, parèsia intestinal, diabetis insípida, etc.

Normalitzada fisiològicament de manera que contingui deu unitats internacionals d'activitat per c.c.

En ampolles de 0.50 c.c. i 1 c.c.

PARKE, DAVIS & CO, LONDRES.

LABORATORI FARMACEUTIC Pons, Moreno i C.^a

Director: D. BERNARD MORALES

BURJASOT ^(Valencia)
Espanya

- | | |
|--------------------|---|
| JARABE BEBE | Catarro dels nens. Tos crònica i rebel dels adults. Infal·lible i inofensiu
<i>Agents exclusius, J. Uriach i C.^a S. A. - Barcelona.</i> |
| TETRADINAMO | (ELÍXIR I INJECTABLE)
Medicació dinamòfora i regeneradora dels estats consumptius. A base de fòsfor, arrhenal, nucleïnat de sosa i estricnina. |
| SEPTICEMIOL | (INJECTABLE)
Insubstituïble en la terapèutica de les malalties infeccioses. Estimulant general de les defenses orgàniques a base de colessterina, gomenol, càmfora i estricnina. |
| EUSISTOLINA | (SOLUCIÓ I INJECTABLE)
Preparat cardío-tònic i diürètic a base de tintures alcohòliques decolorades i valorades de digital, estrofantus escla. |
| MUTASAN | (INJECTABLE)
Tractament bismútic de les espiroquetosis en totes les seves formes manifestacions. Perfectament tolerable. |

En demanar mostres indiqui's estació del ferrocarril