

## Revista de revistes

per C.

### DE QUE MOREN ELS PARISENCES?

El Dr. G. Ichok ha començat un estudi de les causes de mortalitat a París en els cinc quinquennis compresos entre 1909 i 1923, treball que publica la revista "Annales d'hygiène publique".

"Nostre estudi — diu el Dr. Ichok — ofereix en síntesi una caminada dins una necropolis en la quals reposen nombrosos parisencs desapareguts durant tres quinquennis, abans, durant i després la guerra".

En aquest període la població gairebé no ha canviat de nombre, i per això interessa un treball que faci esment de les principals causes de mortalitat en èpoques com l'esmentada. I malgrat l'actual costum de molts metges francesos de no expressar explícitament les causes de defunció dels seus pacients, el Dr. Ichok ofereix un bon quadre de les causes de mortalitat parisenca i de la llur relativa importància.

Entre un total de 672.137 defuncions registrades entre 1909 i 1923 n'hi havia només 4.917 que no estaven especificades la vellesa com a causa de mort ha augmentat lleugerament, però una data ben remarcable és que per cada home mort de bellesa hi ha tres dones. Per aquesta desigualtat el Dr. Ichok no té cap explicació. Quan les morts per suïcidi exposa una taula en la qual hi ha classificades nou menes diferents de suïcidi: Els candidats al suïcidi minvaren en els anys de la guerra — 1914 - 1918 — i la minva persistí en anys posteriors. Però hi ha una excepció en els suïcidis per asfíxia, els quals s'elevaren en els tres períodes a 152, 108 i 305 respectivament. Per altra banda l'asfíxia accidental és prop d'un 50 per 100 menys freqüent després del 1919 que no eren abans i després la guerra. El Dr. Ichok s'inclina a explicar aquesta paradoxa creient que abans i durant la guerra alguns suïcidis per as-

fixia foren inclosos en els termes de *submersion accidentelle*. En tractar de la tuberculosi com a causa de mort trobem la paradoxa de què els tuberculosos pulmonars baixen d'uns 47.000 a prop de 33.000, mentre que la tuberculosi de la larinx manifesta un augment de 585 a 697 en el període que s'estudia.

Aquestes variacions contradictòries probablement, creu el Dr. Ichok, que reflecten canvis en els modes de notificació més que un canvi profund en la aparició de la tuberculosi en aquests dos òrgans; i hom seria molt més aprop de la veritat si en parlar de tuberculosi de larinx no fos dissociada dels pulmons.

Quan l'aparell digestiu com causa de malalties fatals, es remarcable comprobar que les defuncions per úlcera pujaren a 354, 454 i 736 respectivament, en els tres períodes. I en compensació per aquest repenti augment, les xifres de mortalitat per diabetis baixen progressivament en els tres períodes segons indiquen el nombre 2312, 1846 i 1563, de morts respectivament.

### PLETORA I ELS SEUS REMEIS

El Dr. Portmann, senador i professor de medicina de la veïna República, ha esposat un projecte per tal de remeiar la congestió professional mèdica, el qual es limita al sabut expedient de limitar els ingressos en els estudis de medicina. En aquest efecte, àdhuc, ha preparat un projecte de llei. Segons el primer article, el ministre d'Instrucció Pública havia de decidir el nombre d'estudiants que poden ésser admesos, i quans poden passar del primer any d'estudis al segon. El segon article prescriu les condicions de les quals depèn que un candidat pugui ésser inclòs o exclòs de la llista d'estudiants de medicina, les quals han d'ésser sotmeses a un examen en el qual s'ha de tenir una puntuació determinada per