

Càncer genital femení i mama ... ..	2.34 % de tots els malalts.
Càncer genital femení sol . . . . .	25.64 % de tots els càncers.
Càncer genital femení sol . . . . .	1.35 % de tots els malalts.

MITJANS DE QUE AVUI DISPOSA EL DEPARTAMENT DE CANCER DE L'HOSPITAL LE LA STA. CREU I SANT PAU

RADIUM: 684.84 mil·ligrams.  
1 Laboratori Experimental.  
60 llits.

1 Philips.  
1 Super Metalics.  
1 Koch e Sterzel.  
1 Stabilivol.

MITJANS DE QUE AVUI DISPOSA EL DEPARTAMENT DE CANCER DE L'HOSPITAL CLINIC

RADIUM: 644 mgs.  
1 Laboratori Experimental.  
32 llits.  
2 Stabilivolts.

1 Symetric.  
1 Neosymetrie.

### PROFILAXI

Es molt difícil de fer profilaxia en aquesta malaltia l'etiologia i patogènia de la qual desconeixem, però com deia molt bé la Dra. Luisi en parlar de l'organització dels centres anticancerosos, podrem fer la profilaxi de la seva malignitat. Comencen a ésser-nos revelats alguns agents de cancerització, mentre que d'altres no poden ésser comprovats ni per l'experiència, ni per l'experimentació. També sabem que determinades formes histològiques es transformen en lesions canceroses. Es ja demostrada i coneguda la relació de diverses lesions anomenades precanceroses, afeccions de la pell, naevus, etc. i tumors diversos anomenats benignes, fibromes, etc., així com l'eucoplàsies, lupus i cicatrius que en un moment donat poden transformar-se en una neo maligna.

Coneixem també el paper que juguen certs agents químics reconeguts com cancerígens, base alguns d'ells com els derivats del quitrà que han servit per fer els estudis del càncer experimental, altres agents mecànics, tèrmics, parasitaris, i inclús la dolorosa experiència en el nostre estament que dels raigs X que si bé en els malalts han produït èxits en els metges han fet les seves víctimes.

Totes les idees que poden orientar-nos a fer una profilaxi, són dignes d'ésser tingudes en consideració, encara que cap d'elles pugui ésser la base d'una tasca damunt de la qual poden esperar-se un èxit profitós com tots desitjaríem. Acceptant e's quatre grups internacionals i acceptant la guaribilitat que ens donen els serveis es-

pecialitzats en el tractament d'aquesta neoplàsia, es comprendrà fàcilment que essent insuficient a Catalunya per la seva densitat de població i morbiditat per càncer les institucions que actualment existeixen a pesar del zel i competència dels seus dignes directors, doctors Guilera i Carulla, que fan e's impossibles per a atendre els malalts, mantes vegades per falta de llits o de mitjans es perden vides, perquè un malalt que si de bell antuvi l'haguessin ingressat en un Servei adequat, quan la seva lesió era inicial, se li hauria pogut salvar la vida, però l'afluència de malalts que ingressen per rigorós torn, junt amb les dificultats econòmiques perquè atravesia algun d'aquests serveis, fa que no tenint l'assistència necessària, pagui amb tribut de la seva vida aquells que haurien pogut guarir.

Nosaltres, per més que no pertanyem a un Servei exclusivament de càncer, és molt difícil si recordeu el percentatge esfereïdor que acabem de donar, que no veiem uns quants llits ocupats a la sala del Servei de Ginecologia del Dr. Terrades, ocupada per aquestes malaltes, ja que l'entranya uterina té un percentatge de càncer molt gran. A més l'any passat a la Societat d'Obstetrícia i Ginecologia ens van honorar amb el Dr. Vanrell, presentant un nombre considerable de casos de càncer de vulva de localització no gaire freqüent.

Ens plauria molt de tenir una concepció exacta i precisa i que ens fos possible plasmar-la amb