

Laboratorios ROBERT & CARRIÈRE - Paris

STANNOXYL

a base de estaño, exento de plomo, para el tratamiento de las FORUNCULOSIS comprimidos, pomada, líquido, ampollas

IODO BISMUTO ERCÉ

0'02 - 0'04 - 0'08

GLUCO-914 (intramuscular)

0'05 - 0'10 - 0'15 - 0'20 - 0'25 - 0'30 - 0'40 - 0'50 - 0'60

ACEITE GRIS ERCÉ

0'04 - 0'08 - 0'10

para el tratamiento de la SIFILIS
Indoloras, en ampolla-géringa

LITERATURA Y MUESTRAS:

M. SOLER ELÍAS Riera S. Miguel, 25 BARCELONA


PIPERACINA MIDY

GRANULADO
EFFERVESCENTE

"El más rico en principio activo."

Especificar bien
el nombre MIDY
para evitar
Las
substituciones

Solubilidad comparada del
Ácido Úrico en.



2 a 4
Cucharadas
de las de café
por día.

MUESTRA: LABORATORIOS MIDY
9, Rue du Commerce
PARIS

Lipocithine

-Ampollas inyectables de 2 y 5 c. c. esterilizadas según el método de Tyndal

Medicación dinamo-génica y antitóxica **INDOLORAS**

FORMULA: COLESTERINA a. a. 5 gramos
LECITINA a. a. 5 »

Aceite de olivas, lavadas al alcohol y esterilizadas 100 gramos a dividir en ampollas

INDICACIONES: PRETUBERCULOSIS, TUBERCULOSIS, CONVALESCENCIAS, ANEMIA CANCEROSA, ANEMIAS, NEURASTENIA, ASTENIAS

Spirby

AMPOLLAS de 3 c. c. conteniendo 0 gr. 10 por c. c. de Ioduro doble de Bismuto y de Quinina en suspensión aceitosa de colesteroína, lecitina y alcanfor

MEDICACIÓN SPIRILICIDA POR EL BISMUTO EN MEDIO LIPOIDICO

Laboratorio DOUETEAU FRERES - 20, Faubourg Saint-Honoré, PARIS
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS

Concesionario general para España: N. LEVI, Sepúlveda, 103, Barcelona