

Per a la quimioteràpia de la tuberculosi:

# SANOCRYSSIN ORIGINAL MOLLGAARD

Dosis:  
0/01 - 0/025  
0/05 - 0/10 - 0/15  
0/25 - 0/50 - 0/75  
1/00 gm.

Mostres i literatura extensa a disposició  
de tots els Srs. Metges que les sol·liciten.



**COMERCIAL IBERO DANESA S.A.**  
Calle Sarrià, 7 LABORATORIO "LEOBYL" Barcelona (Sarrià)

## Tratamiento bioquímico de las úlceras gastroduodenales **LAROSTIDINA "ROCHE"**

Solución al 4 % de clor-hidrato de histidina en ampollas de 5 c. c.  
Inyección indolora, intramuscular o subcutánea - Una ampolla al  
día durante 3 semanas aproximadamente  
Sedación rápida del dolor :: Ninguna contraindicación

**Barcelona - Productos Roche, S. A. - Madrid**



Medicaments per a la Dermo-sifilologia  
i Oftalmologia i Oto-rino-laringologia

(Sol·licitó literatura i consulti la nostra publicació periòdica "Analecs Terapèutics")

**L**aboratoris del Nord d'Espanya, S. A.  
Especialitats: Otol., i Odonon., Barcelon., 33