

De col·laboració

La febre tifoide a Catalunya

L'endèmia tífica a Barcelona

per

J. AIGUADER I MIRÓ

MORBILITAT TÍFICA

Els metges no s'han acostumat encara a notificar els casos d'infecció. Cal dir en llur excusa que la família del malalt, per motius pusil·lànimes moltes vegades (temor a la intervenció de la higiene pública), i moltes més per interessos comercials, la clientela de la botiga perilla davant el temor del contagi, els coacciona perquè no ho facin i el bon company es troba en el cas de consciència de relaxar els deures amb la col·lectivitat o mancar al secret professional. L'any 1934 es notificaren 479 tifoides; en 1935 se n'han denunciat 507. Això és un mal perquè dificulta l'estadística i, sobretot, dificulta en perjudici del ciutadà, àdhuc d'aquell repatani que s'hi oposa, l'acció de la higiene pública. Però, a més, com passa en molts dels casos que la coacció arriba al màxim, s'oculta un perill ciutadà. Com acabem de dir, és el crèdit de la botiga el que es vol salvar; botiga, sovint, de queviures, amb pèssimes condicions d'estatge per a aïllar un malalt, i que, amb freqüència, el que el cuida està en contacte constant amb el públic i amb els gèneres alimentaris.

Aquesta ocultació ens obliga, per a calcular la morbiditat, relacionar-la amb la mortalitat, si és que en volem tenir una idea aproximada; xifra enganyadora perquè la relació entre ambdues és molt incerta i varia segons les epidèmies i els pobles. Mentre algunes epidèmies arriben al 20 ó 25 per 100, altres oscil·len entre el 10 i 15. L'endèmia barcelonina es manté entre aquestes darreres xifres, però són molts els metges que el fixen al 12 per 100. Acceptarem com a bo aquest percentatge que suposa menys de 2.000

atacats en 1933, menys de 2.500 en 1934 i uns 2.000 en 1935.

MORTALITAT PER DISTRICTES MUNICIPALS

La disminució de la mortalitat tífica ha afectat de distinta manera les barriades barcelonines. És lògic que sigui així, perquè cada barriada té característiques especials en la població i en la higiene. Inserir a continuació la taula de mortalitat de cada districte municipal des del 1924 al 1935 i la taula de coeficients que corresponen a la seva mortalitat durant els anys 1924, 1933, 1934 i 1935. Les dades anteriors al 1924 són més costoses de calcular perquè en aquell any es féu una nova distribució dels districtes urbans.

Coeficient de la mortalitat tífica per 1.000 habitants en els anys 1924, 1933, 1934 i 1935

Districtes	1924	1933	1934	1935
I	0'39	0'07	0'13	0'12
II	0'26	0'08	0,24	0'11
III	0'31	0'06	0'08	0'09
IV	0'26	0'19	0'12	0'01
V	0'31	0'13	0'11	0'10
VI	0'26	0'12	0'15	0,13
VII	0'37	0'15	0'19	0'10
VIII	0'32	0'22	0'17	0'15
IX	0'46	0'09	0'15	0'12
X	0'57	0'07	0'10	0'10