

En 1935, en apaivagar-se la lleugera envestida endèmica de l'any anterior, es refan els coeficients del 1933.

Cal tenir en compte que els morts dels nosocomis són desglossats dels districtes on oficialment vivien. Dels 45 morts en hospital i clíniques en 1934, 20 vivien al districte I, 9 al VI, i 15 al IX. En 1935, vivien al districte I, 29 al III, 5; al V, 1; al VI, 16; al VIII, 4, al IX, 9.

#### MORTALITAT PER MESOS

A continuació donem la mortalitat per mesos des de l'any 1922:

duir la malaltia que fou flagell de Barcelona fa pocs anys i avui encara és perill seriós, que desdiu de les seves qualitats de gran ciutat. Perquè, com haurem de repetir moltes vegades, la febre tifoide controla, potser més que cap altra malaltia, la tècnica que una urbs posa en benefici dels seus veïns. Podriem dir que és la malaltia urbana per excel·lència; quan arriba a altes xifres o les incrementa, acusa defectes i descuits higiènic en el règim ciutadà.

A desgrat de l'optimisme i confiança que es desprenen de les xifres esmentades, cal que no defallim i abandonem la partida. El que hem aconseguit fins ara, no és tot el que cal esperar. Podem anul·lar gairebé per complet el tifus en

#### DEFUNCIONS, PER MESOS, DE FEBRE TIFOIDE

Anys	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Nbre.	Dbre.	Total
1922.....	9	13	10	20	12	18	26	51	46	50	39	31	325
1923.....	50	25	29	22	21	15	16	45	50	32	33	41	379
1924.....	39	29	29	13	15	19	27	44	52	42	38	16	363
1925.....	10	14	19	17	18	8	18	13	28	33	21	14	203
1926.....	8	12	15	14	8	14	20	25	31	38	23	20	228
1927.....	10	10	5	12	10	10	28	21	22	14	15	19	190
1928.....	11	13	9	8	13	10	19	29	33	26	22	21	214
1929.....	6	5	6	8	7	8	17	28	15	32	20	21	173
1930.....	15	12	11	4	19	16	6	15	22	29	21	21	191
1931.....	22	12	10	7	13	16	17	22	37	35	30	20	242
1932.....	20	8	12	16	12	11	11	26	39	41	20	18	234
1933.....	7	5	8	11	12	10	22	21	25	65	16	16	165
1934.....	13	13	10	9	2	7	19	25	40	27	18	18	201
1935.....	10	7	9	9	14	6	18	20	24	22	25	18	182
Mitjana, 14 anys <sup>S</sup>	16'42	13'42	13'00	12'14	12'57	12'07	18'85	27'78	33'14	31'21	31'50	20'78	235

De la mitjana dels catorze anys que van del 1922 al 1935, es dedueix que des del mes de febrer a juliol s'acusa la mortalitat més baixa de l'any, escaient-se la xifra menor en juny. Pel juliol s'incrementa la infecció amb un ascens ràpid que creix amb persistència durant els mesos d'agost, setembre, octubre i novembre, coincidint l'acmé en setembre. En desembre s'inicia la davallada que s'accentua en gener.

#### COMPARACIÓ AMB ALTRES PAÏSOS

Aquestes dades serveixen per a situar de bell antuvi la lluita antitífica. En el transcurs dels articles que ens proposem dedicar al tema, sovint hi farem referència, i, junt amb altres que els complementaran, estudiarem la manera de re-

Barcelona. Si hem vençut en la part més difícil i costosa, poc ens costarà acabar l'obra amb èxit total.

Alemanya té un nombre de mortalitat d'1 per 100.000, i hi ha nacions que ni a aquesta proporció arriben: Com Suïssa, Noruega i Nova Zelanda. A Suècia, Anglaterra i País de Gal·les hi ha sis morts de tifus per 1.000.000 d'habitants. I si deixem les nacions i anem a les capitals que, per llurs condicions urbanes, poden comparar-se amb Barcelona, tenim que a Berlin i Brusel·les donen l'1 per 100.000 també, i per sota aquesta unitat hi ha Berna, Nova York, La Haia, Hamburg, Londres i Xicago. Dublin té dos morts per 1.000.000 d'habitants.

Aquestes han d'ésser les nostres fites i encara hem de maldar per a superar-les.