

Laboratorios ROBERT & CARRIÈRE - Paris

STANNOXYL

a base de estaño, exento de plomo, para el tratamiento de las FORUNCULOSIS comprimidos, pomada, líquido, ampollas

IODO BISMUTO ERCÉ

0'02 - 0'04 - 0'08

GLUCO-914 (intramuscular)

0'05 - 0'10 - 0'15 - 0'20 - 0'25 - 0'30 - 0'40 - 0'50 - 0'60

ACEITE GRIS ERCÉ

0'04 - 0'08 - 0'10

para el tratamiento de la SIFILIS indoloras, en ampolla-geringa

LITERATURA Y MUESTRAS:

M. SOLER ELÍAS Riera S. Miguel, 25 BARCELONA

PIPERACINA MIDY

"El más rico en principio activo."

Especificar bien el nombre MIDY para evitar las substituciones

Solubilidad comparada del Activo Unico en.



2 o 4 Cuchamadas de las de café por día.

LABORATORIOS MIDY
Rues de Cassinière,
PARIS

Lipocithine

Ampollas inyectables de 2 y 5 c. c. esterilizadas según el metodo de Tyndal

Medicación dinamogénica y antitóxica INDOLORAS

FORMULA: COLESTERINA a. a. 5 gramos
LECTINA a. a. 5 »

Aceite de olivas, lavadas al alcohol y esterilizadas 100 gramos a dividir en ampollas

INDICACIONES: PRETUBERCULOSIS, TUBERCULOSIS, CONVALESCENCIAS, ANEMIA CANCEROSA, ANEMIAS, NEURASTENIA, ASTENIAS

Spirby

AMPOLLAS de 3 c. c. conteniendo 0 gr. 10 por c. c. de Ioduro doble de Bismuto y de Quinina en suspensión aceitosa de colestherina. lecitina y alcanfor

MEDICACIÓN SPIRILICIDA POR EL BISMUTO EN MEDIO LIPOIDICO

Laboratorio DOUETEAU FRERES - 20, Fuabourg Saint-Honoré, PARIS
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS

Concesionario general para España: N. LEVI, Sepúlveda, 103, Barcelona