



L'extracte original
del lòbul posterior
de la hipòfisis.



LA Pituitrina fou introduïda a la professió mèdica l'any 1908. No té qui la iguali, no solament respecte a la uniformitat, sino que també amb relació a l'estabilitat i puresa.

PITUITRINA

P., D. & Co.

INDICACIONS:

INÈRCIA uterina, retenció de la placenta, hemorràgia ginecològica, shock, col-lapse, asma, parèsia intestinal, diabetis insípida, etc.

Normalitzada fisiològicament de manera que contingui deu unitats internacionals d'activitat per c.c.

En ampolles de 0.50 c.c. i 1 c.c.

PARKE, DAVIS & CO. LONDRES.

LABORATORIS
Opoteràpics i Biològics FHER

Adreno Calcina

Carrer Jaume Piquet, edifici Fher (Sarrià)
BARCELONA

PRODUCTES **TURON**
NEUROTÈRÀPICIS

Neuronal Turon — Excltació insomni

Fenlcal — Epilèpsia

Fosford Turon — Depressió psíquica

Mostres:

LABORATORIS TURON : Llúria, 96 - BARCELONA

Nucléarsitol Robin

Granulat, Comprimits, Inyectable

Camphydryl Robin

DERIVAT CAMFORAT EN SOLUCIÓ ACUOSA
EN AMPOLLES DE 1, 2 i 5 C. C.

Pretuberculosis
Malalties degeneratives
Paludisme

Totes les aplicacions
de la CAMFORA
Injeccions, aplicacions
locals antisèptiques