

Tratamiento bioquímico de las úlceras gastroduodenales

LAROSTIDINA "ROCHE"

Solución al 4% de clorhidrato de histidina en ampollas de 5 c.c. - Inyección indolora, intramuscular o subcutánea - Una ampolla al día durante 3 semanas aproximadamente

Sedación rápida del dolor : : : Ninguna contraindicación

Barcelona — PRODUCTOS ROCHE, S. A. — Madrid

EL TRATAMIENTO DE LAS TUBERCULOSIS QUIRURGICAS

ACEITE IODADO
INYECTABLE
FINIKOFF

POR EL
METODO
DEL
D^R. FINIKOFF

CALCIUM
FINIKOFF
(INTRAVENOSO)

Laboratoire des Produits SCIENTIA . 21 Rue Chaptal . Paris . 9^e
Literatura y muestras : D.M. Moses . 2 D^o Plaza Independencia - Madrid.

LABORATORI FARMACEUTIC PONS, MORENO I C.^A

Director: D. BERNARD MORALES
BURGASOT (València) Espanya

- | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JARABE BEBE | { Catarro dels nens. Tos crònica i rebel dels adults. Infal·lible i inofensiu - Agents exclusius, J. Uriach i C. ^a S. A.-Barcelona |
| TETRADINAMO | { (Elixir i injectable)
Medicació dinamòfora i regeneradora dels estats consumptius.
A base de fòsfor, arrhenal, nucleínat de sosa i estricnina |
| SEPTICEMIOL | { (Injectable)
Insubstituïble en la terapèutica de les malalties infeccioses.
Estimulant general de les defenses orgàniques a base de coles-
terina, gomenol, càmfora i estricnina |
| EUSISTOLINA | { (Solució i injectable)
Preparat cardio-tònic i diürètic a base de tinturas alcohòliques
decolorades i valorades de digital, estrofantus escila |
| MUTASAN | { (Injectable)
Tractament bismútic de les espiroquetosis en totes les seves
formes i manifestacions. Perfectament tolerable |

En demanar mostres indiqui's estació del ferrocarril