


PARACHOC



ESPECÍFIC DEL SÍNDROME HIPERTENSIU ARTERIAL

Tois els tipus del síndrome hipertensiu arterial amb els símptomes secundaris de cefalea, vertigens, vòmits, formigüeix, sofocació, sensació de dit mort, etc.

En els espasmes vasculars, cerebrals, (apoplexia) mesentèrica i perifèrica.

En la hiperemotilitat i en les discriñades simpàtico tòniques.

Parachoc

TERAPÉUTICA DESENSIBILITZANT

Hiposulfit sòdic i magnèsic en combinació calci-bromurada, en tubs inlecciables endovenós i gragees que ral·litzades.

Evita i cura el «shock» anafilàctic, desensibilitza l'organisme, estimula la funció cel·lular, retarda l'evolució de les manifestacions neoplàsiques.

Parachoc Espènic


Associació d'hiposulfit sòdic i magnèsic amb extracte de melsa desaluminat. Per injecció intramuscular absolutament indolor.

Dermatosis alèrgiques, úlceres varicoses, llagues atòniques, prurits, eczemes aguts, etc.

TENSIDOWN



Canfolic



PRIMER PRODUCTE NACIONAL DE CAMFORA AMONIACAL NEUTRE HIDRO-SOLUBLE

Toles les propietats de l'oli camforat sense cap dels seus inconvenients.

No produeix nòduls. Absorció immediata. Efectes ràpida i constante. Permet emprar sense cap perill la via endovenosa.

FORMA INJECTABLE:

Canfolic simple

- * associat amb cafeïna
- * * * digitalina
- * * * caparoteïna
- * * * estringina
- * * * estrofantina
- * * * efedrina
- * * * quinina

en tubs de 1, 2 i 5 c.c.

(ABSOLUTAMENT INDOLOR)

GOTES:

- | | |
|-------------------------|----------|
| Canfolic simple | - |
| associat amb digitalina | * |
| | * |
| | efedrina |

SON TRES ESPECIALITATS DEL

Labocatori A.R.G.A.

BARCELONA
PARIS - 201

MADRID
EDUARD DATO - 27