

Laboratorios ROBERT & CARRIÈRE · Paris

STANNOXYL

a base de estaño, exento de plomo, para el
tratamiento de las FORUNCULOSIS
comprimidos, pomada, líquido, ampollas

iodo BISMUTO ERCÉ

0'02 - 0'04 - 0'08

GLUCO-914 (intramuscular)

0'05 - 0'10 - 0'15 - 0'20 - 0'25 - 0'30 - 0'40 - 0'50 - 0'60

ACEITE GRIS ERCÉ

0'04 - 0'08 - 0'10

para el tratamiento de la SIFILIS
indoloras, en ampolla-géringa

LITERATURA Y MUESTRAS:

M. SOLER ELÍAS Riera S. Miguel, 25 BARCELONA

En las

Bronquitis crónicas

Gripe

Tuberculosis

Constipados descuidados.
Tosés rebeldes Asma.

Una cucharada de las de sopa
por la mañana a medio día, y por la noche de

JARABE FAMEL

*Calma rápidamente la Tos, facilita la Expectoraçión
obra favorablemente sobre el estado general*

Muestras a disposicion de los Seors. Médicos
Agentes Generales para España
GURIÉL Y MORÁN Arco 228 Barcelona

Lipocithine

Ampollas inyectables de
2 y 5 c. c. esterilizadas se-
gún el metodo de Tyndal

Medicación dinamo-génica y antitóxica **INDOLÓRAS**

FORMULA: COLESTERINA a. a. 5 gramos
LECITINA a. a. 5 »

Aceite de olivas, lavadas al alcohol y esterilizadas 100 gramos a dividir en ampolla

INDICACIONES: PRETUBERCULOSIS, TUBERCULOSIS, CONVA-
LENCIAS, ANEMIA CANCEROSA, ANEMIAS, NEURASTENIA
ASTENIAS

Spirby

AMPOLLAS de 3 c. c. conteniendo 0 gr. 10 por
c. c. de Ioduro doble de Bismuto y de Quinina
en suspensión aceitosa de colestereina, lecitina y
alcanfor

MEDICACIÓN SPIRILICIDA POR EL BISMUTO EN MEDIO LIPOIDICO

Laboratorio DOUETEAU FRERES - 20, Fuabourg Saint-Honoré, PARIS
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECIFICOS

Concesionario general para España: N. LEVI, Sepúlveda, 103, Barcelona