

Administrar el SALICILAT SODIC en les formes del

SALISOD

ES FER-HO AMB LES MAXIMES GARRANTIES D'EFICACIA I TOLERANCIA

F O R M E S :


VIA GASTRICA:

VIA INJECTABLE:

SOLUCIO Dos grams per cullerada
EFFERVESCENT en pols. Tolerancia organica absoluta

ENDOVENOS 10 i 20 %. Solució en suero glucosar
INTRAMUSCULAR. Completament indolor

LABORATORI FARMACEUTIC MARTI CUATRECASAS • ESPECIALITATS SALICILIQUES
Valencia, 304 - Barcelona - Telefon 77829



Medicaments per a la Dermo-Sifilologia
OTITIMOLOGIA IOTO-RINO-LARINGOLOGIA
"Borichl Barrens i consult lo nostre publicació periodico "Anales Terapèuticas"
Laboratori del Nord d'Espanya, s.a.
C/ Castellana 141, 1.º, Madrid, España. 2.º

COMPRIIMITS de CODIFORME BOTU

Poçó verament seca, no és cap barreja banal de Codeína-brom CODIFORM, sinó una nova sal bromofòrmica cristal·litzada en comprimits rigorosament dosificats. Aquestes es dissolen en els intestins sense produir cap mena de fatiga a l'estómac, com fan els xarops, pocions, gotes, etc.

Demaneu mostres als Srs. Gimenez Sallinas & C., Sagüés, 214 - Barcelona (S. G.)

Tos vòmica
del tuberculós



DOSE CORRENT:
5 comprimits per dia. 8 quan
la febre és rebel.