

UN CAS DE VAGINA DOBLE

pel **Dr. Sala Parés**

La raresa del cas que us presentaré i els detalls de la tècnica emprada per a solucionar-lo ens indueixen a posar-lo a la vostra consideració.

Aquest vici de conformació constituït per una paret longitudinal gairebé completa de tota la vagina és, com sabem, el resultat de la falta de fusió dels dos conductes de Müller per una detenció del seu desenrotllament durant la vida intrauterina.

Hem de recordar alguns detalls embriològics. En el sexe femení el conducte excretor deriva dels dos conductes de Müller que en certa època del seu desenrotllament la seva persistència contrasta amb l'atròfia que sofreixen els conductes de Wolff. Tots sabeu que els conductes de Müller són per a la femella el que els de Wolff són per al mascle.

El conducte de Müller ha de considerar-se esquemàticament dividit en tres porcions: una superior amb una obertura peritoneal que forma el pavelló de la trompa, una part mitja que dóna lloc a la mateixa trompa, i la inferior que en fusionar-se amb la de l'altre costat constitueix l'úter i la vagina.

Testut defineix el dit desenrotllament de la manera següent: els conductes de Wolff i els conductes de Müller en arribar a la part inferior del cos de Wolff, es situen en la línia mitja i reunint-se entre si per una massa conjuntiva, formen un cordó conegut amb el nom de cordó genital. En aquest cordó, els dos conductes de Müller es fusionen en la part mitja del segment terminal, i si se'ls segueix des de baix, es veu que al principi estan separats, i que més amunt s'uneixen i es confonen en un sol, i, més amunt encara, tornen a separar-se. Per últim, la seva fusió es fa completa en sa porció terminal i es troben així íntimament adherits per a formar l'úter i la vagina.