

## UN CAS DE QUIST SERÓS RETROPERITONEAL

pel Dr. J. Salarich Torrents

En els darrers anys, la classificació de les tumoracions quístiques retroperitoneals i mesentèriques, ha sofert notables modificacions, degudes, sens dubte, a l'acurat estudi que d'aquestes s'ha portat a cap, el qual ha permès establir tipus ben distintos en relació a llur anatomia patològica i llur etiologia.

En primer lloc, des dels treballs de Bauer i el complet estudi de Proust i Monod, cal separar dos grans grups de quistos: els retroperitoneals, i els vertaders quistos de mesenteri. No parlarem d'aquelles tumoracions quístiques situades accidentalment en aquells llocs: quistos hidatídics, dermoides, quistos wolfians, enteroquistos, etc., els treballs de Pagentecher, Lecene, Dowd, Niosi, separen ben definitivament aquells grups de la lesió que estudiem. Cal arribar als treballs de Drucbert i Cuneo per a trobar aïllats els dos grans grups de quistos dels mesos intestinals. Els quistos serosos retro o para peritoneals, relativament poc freqüents, i els quistos limfàtics, vertaders quistos del mesenteri estudiats inicialment, car creiem interessant l'exposició d'una lesió relativament quist serós retroperitoneal, i estudiarem el cas i la seva etiologia clínica i tractament car creiem interessant l'exposició d'una lesió relativament poc freqüent i que com diu Gautier, sols és reconeguda generalment en el moment de la intervenció, podent abans d'aquesta ocasionar múltiples errors de diagnòstic.

La història clínica del malalt observat per nosaltres és la següent:

Josep Guitart, de 64 anys d'edat, natural de Castellar de N'Hug, domiciliat a Sant Hipòlit de Voltregà. Pares morts cardíacs. Casat, 9 fills, 2 morts petits. De petit: xarampió. Als set anys, amputació traumàtica