

INDICACIONS MÈDICO-QUIRÚRGIQUES DE LA TRANSFUSIÓ DE SANG

pel **Dr. M. Miserachs**

Metge a. del Servei de transfusió de sang de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, de Barcelona

L'objecte d'aquesta conversa és discutir algunes de les indicacions de la transfusió de sang i fer veure com la transfusió no ha d'ésser el recurs d'eficàcia extraordinària a emprar quan un malalt ja s'està morint. No és possible parlar de totes les indicacions, puix que si ho féssim hauríem d'especular sobre una sèrie d'hipòtesis de patogènia i de terapèutica que minvarien l'interès pràctic del tema i a més obligarien a donar una extensió desmesurada a aquestes ratlles. Així, doncs, parlarem concretament de les indicacions precises i més freqüents de la transfusió, i farem alguns comentaris sobre el moment més oportú per a practicar-la, la dosi a injectar en cada cas i la possible necessitat d'haver de repetir la transfusió.

La principal indicació de la transfusió de sang és indubtablement l'anèmia aguda posthemorràgica. Ara bé, l'hemorràgia pot produir-se en diferents òrgans i per variats mecanismes que cal tenir en compte en fer la indicació de la transfusió. Començarem per les hemorràgies que es produeixen en els òrgans de l'aparell digestiu. La gastrorràgia per ulcus, per neoplàsia o per lues és la forma més freqüent. Actualment per aquesta sola indicació portem fetes més de setanta transfusions. Quan un malalt té una gastrorràgia inicial mai no pot dir-se per la simple observació de la quantitat de sang vomitada, si l'hemorràgia és petita i si es repetirà o no es repetirà. I aquesta incertesa depèn del desconeixement que tenim de la mena de lesió que ha provocat l'hemorràgia. Pot ésser que s'hagi ulcerat un vas d'escàs calibre i llavors amb mantenir