

La resistència que les embarassades posaven a ésser visitades durant la gestació, va defallint de dia en dia, i avui es presenten a la consulta mèdica o tocològica, segures del benefici que aquest pas pot representar per a la seva encaminada maternitat.

Aquí a Vic, en el terme de dos anys que venim actuant en aquest sentit, hem vist augmentar considerablement el nombre d'embarassades que acuden als nostres centres de treball, per tal d'obtenir l'aquiescència de la normalitat del seu estat, o bé oir el consell que ha de regular un aspecte desorientat del seu organisme gràvid.

Malgrat tot i la nostra bona voluntat, el nostre esforç no abarca encara prou extensió perquè els resultats siguin millors i el nostre treball de previsió el més perfecte possible.

S'ha de comptar, per obtenir els fruits òptims que hom pot aspirar a conquerir amb la pròpia i aliena experiència de la gent i principalment amb els medis directius dels facultatius, metges i llevadores, que són, podríem dir, la primera mà guiadora envers la felix deslliurança del fill.

Ginecològicament, val la pena de dir alguna cosa sobre algun dels síndromes observats.

Els dos casos esmentats d'atresia genital es refereixen un d'ells a una imperforació himeneal en una nena de tres anys i l'altra a una absència absoluta de vagina i probablement d'úter en una malalta de 22 anys. Aquesta última refusà tota temptativa operatòria davant de l'aleatori resultat a què s'exposava.

Els quatre casos de fibroma uterí, es refereixen a dos de molt petites tumoracions d'escassa importància; altra, susceptible d'intervenció quirúrgica, i un altre voluminós que donava menorràgies copioses i alarmants fou tractat amb radioteràpia amb excellent resultat.

De les anexitis apuntades, tres es refereixen a lesions gonocòciques i dues a processos inflamatoris, millorades amb un tractament mèdic apropiat. Altres dues intervingudes en el Servei Quirúrgic de l'Hospital.

Finalment, tenim dos casos de gestació extrauterina, diagnosticats en el primer estadi de la seva evolució, als quals se'ls recomanà la intervenció immediata. Ambdós foren operats amb bon resultat, en una Clínica privada de Vic l'un, i en una Mutualitat barcelonina l'altre.

Cal afegir que hem practicat en 7 casos un tractament específic en malaltes portadores d'una història obstètrica carregada de fracassos fetals. Alguns d'ells fora de l'embaràs, com a preventiu de noves fallides; altres tres en embarassades, havent obtingut en tots aquests el resultat òptim d'un fill viu i sà.