

## TRAUMÀTICS

El nombre total de traumàtics assistits és de 58 dels quals 37 han estat hospitalitzats i els 21 restants han estat externs.

Dels hospitalitzats 26 són homes i 11 dones i dels externs 13 són homes i la resta dones.

Tots els malalts han estat visitats dues vegades per setmana directament pel cirurgià cap del servei i els dies restants pels facultatius adscrits al servei quirúrgic.

### Operacions efectuades :

13 exeresis de ferides de diverses regions efectuant-se 11 sutures primitives. 1 craneotomia per fractura vòrtex i base crani 1 laparotomia per ferida penetrant d'abdomen 1 exeresi i sutura primària per ferida penetrant	del tòrax 2 sutures tendinoses dels muscles dels avant-bracos 4 extrac. de cossos estranys de diverses regions 3 traccions alàmbriques de Kirschner
--	--

### Classificació dels traumatismes:

<p><i>Ferides</i></p> Ferides diverses regions . . . . . 15 » amb inclusió de cos estrany . . . . . 4 ext. 3 Ferida amb secció tendinosa . . . . . 3 <p><i>Luxacions</i></p> Luxació escàpul humeral . . . . . 4 » 2 » de cùbit i radi . . . . . 2 » 1 <p><i>Fractures</i></p> Fractura de columna cervical a nivell 6-7. . . . . 1 Fract. supra-intercondilea húmer . . . . . 1 » 1 » dialisària de l'húmer . . . . . 2 » coll quirúrgic de l'húmer . . . . . 3 » 1 » diàlisi de cùbit i radi . . . . . 3 » 2 » extremitat distal cùbit radi . . . . . 3 » 2 » de clavicula . . . . . 3 » 2	Fract. de costelles . . . . . 1 ext. » de pelvis . . . . . 1 » de » i luxació central fèmur. . . . . 1 Fract. de coll de fèmur . . . . . 2 » de la dialisi femoral . . . . . 3 » supra intercondilea fèmur. . . . . 1 » dialisària de tibia i peronè . . . . . 1 » bimaleolar . . . . . 1 » » de maleol extern . . . . . 2 » 1 » oberta de verte de crani. . . . . 1 » de base de crani . . . . . 3 <p><i>Altres</i></p> Distorsions tibio astragalina sense fractura . . . . . 2 Contusions dorso - lumbar sense fractura . . . . . 2 »
---	---

En tots els casos que la seva dolença ho ha permès, el traumatitzat ha estat donat d'alta hospitalària tan aviat com ha estat possible, continuant el tractament fins a la completa curació en el seu domicili i assistint periòdicament a visitar-se en el Dispensari de l'Hospital tal com se li va ordenar, considerant el traumatitzat com accidentat més que com a malalt; seguint les concepcions de Böhler en aquest cas, ens ha reportat enormes avantatges pel mateix pacient en els ordres moral i material, obtenint resultats molt satisfactoris ensems. En el tractament dels diferents fracturats hem emprat diversos aparells tals com el tractor a torniol de Böhler, les traccions contínues de Kirschner, l'estrep de Schmerz, ferules de Cramer, de Lange, Böhler, Pouliquen, com així mateix el quadre Balkanic de tots els quals avui ja disposa l'Hospital com a propis. Hem de lamentar-nos del fet de rebre els traumatitzats moltes vegades tardanament, havent transcorregut massa hores del traumatisme, i això motiva que, disposant de tots els mitjans, no podem obtenir-ne el màxim rendiment; malgrat tot, els resultats obtinguts són bons anatòmicament i funcionalment, com pot deduir-se de les estadístiques.