

nal, perquè va cedint a les parets d'aquest conducte les fibres que l constitueixen, contraient, per lo tant, fortes adherències am les mentades parets. Se desprèn, doncs, com a logica conseqüència, que a l'arribar el lligament rodó en l'anell extern del conducte de Falopi queda reduït a ben poca cosa, i és per això que és tant difícil trobar-lo en el punt d'elecció en l'operació d'Alexander. Per lo que acabo de dir se comprèn am facilitat que l'extrem cutani és sumament prim, i com per altra part se troba recobert per una bola de greix que pot servir de guia pera buscar-lo, queda per aquest fet solapada la seva situació. Per això s pot comprendre quant augmenten les dificultats sempre que s tracta de fer l'operació am dónes que tenen gran abundància de teixit adipós. Apart d'això, és precís també considerar les diferències individuals que, com amb altres entranyes, s'observa en aquest cas, puix que està en relació l seu desenrotllament am la funció que està exercint tal lligament. Per lo tant, sabent que la seva missió és mantenir la matriç inclinada cap endavant amb el petit grau de flexió en que s'observa en les seccions antero-posteriors de cadavres congelats, no ns ha d'estranyar el que presenti un desenrotllament més o menys considerable tenint en compte les condicions que compleix com a factor integrant de l'estatica de la pelvis. Com en les multipares els lligaments rodons han tingut de sofrir varies vegades l'influència de l'embrac, és clar que han reforçat els seus vinculs d'inserció, i per lo tant se mostren força millor que en els casos en que l'organisme s presenta depauperat i debil, en que arriben a desaparèixer quasi del tot per les males condicions de nutrició i pel desquiciament orgànic. De les meves observacions he pogut deduir que, si bé és molt costós trobar-lo a la sortida del conducte inguinal, és, a pesar de tot, possible, havent dissecat bé la regió moltes vegades.

Entrant ja en l'estudi de les condicions anatòmiques, dec apuntar, sense fer alardes anatòmics, que l lligament rodó, sortint del corn de l'uter, camina per l'ala anterior del lligament ample, dirigint-se al conducte inguinal, per on passa a fi d'escampar-se després en la regió pubiana, on pren inserció per medi d'algunes fibres que van a l'espina del pubis i altres que s fonen en el teixit gras del gran llavi, deixant apart, i força és fer-ho notar, que en el trajecte pel conducte inguinal se van quedant algunes fibres que s fixen a la paret de l'expressat conducte seu, a pesar de tot bastant movable pera poder ésser estirat cap a