

a l'apreciar les indicacions de l'operació que m'ocupa, puix que, si no va destinada a satisfer les especials indicacions que pot complir, no hem d'esperar cap bon resultat, ja que aleshores, si cap la comparació, ens trobariem en el mateix cas d'un metge internista que volgués curar a una clorotica, d'origen dyspeptic, administrant-li preparats de ferro, perquè estan indicats en aquella malaltia. Així com el metge, en aquest cas particular, ha de preocupar-se de tractar la dyspepsia perquè, curada aquesta, la malalta s'aliviarà de l'anèmia (i si acas aleshores els tonics amb els marçials podran produir el seu efecte), de la mateixa manera l gynecolec, al trobar-se davant d'una malalta que tinga una desviació uterina, ha de regoneixer per quina causa s'ha produït el desplaçament, a fi de que l desenrotllament del seu plan therapeutic pugui satisfer indicacions ben precises i l'èxit de les intervencions que faci recompensi els seus desitjos.

Ès corrent observar en la pràctica desviacions uterines produïdes per l'alteració combinada de varies de les condicions que presideixen l'equilibri physiologic de la pelvis, veient-se precisat el gynecolec a practicar algunes operacions combinades. Succeeix això quan, además de la posició viciosa de la matriç, deguda, per exemple, a una falta de sosteniment de la baixa pelvis, hi ha una alteració en el parenchyma de l'orgue que ajuda i entre-té l cambi morphologic.

Pera acabar, les condicions gynecologiques de l'hysterorraphia inguinal se resumeixen dient que l'uter ha d'esser mobible pera poder-lo adreçar i fins pera poder-lo posar en anteversió; que s'ha de practicar en les retro-desviacions i en el prolapse, sense adherencies, no necessitant cap operació complementaria mentres hi hagi integritat de la regió perineal i de la vagina (prolapse utero-vaginal d'Auvard). També s fa amb admirables resultats quan hi ha caiguda de l'ovari en el fons-de-sac de Douglas, amb esterilitat consecutiva, demostrant l'embracç (1) els bons efectes de l'operació. Quan am la fluixedat lligamentosa se combina l'alteració de la vagina, del periné o de l'estructura uterina, s'ha d'associar amb operacions complementaries pera que dongui bons resultats. En el prolapse complet és sempre insuficient.

(1) *Reciprocal effects of pregnancy and parturition upon the operation of shortening the round ligaments of the uterus*, per Alexander (*Lancet*, vol. II, pag. 236, 1890).