

TRACTAMENT CONSECUTIU A LES OVARIOTOMIES

per J. PIN

PROFESSOR DE LA CLINICA GYNECOLOGICA

(Acabament)

Tots els medis aconsellats pera dominar el colapsus són aplicables al tractament d'una altra complicació temible: les hemorragies consecutives. Tenen aquestes llur origen en els vasos del pedicul, les adherencies rompudes en el teixit celular i els llavis de la ferida abdominal, i sobrevenen dintre les primeres vintiquatre hores o al cap de vuit o dotze dies. Lo més dolent és que depengui l'hemorragia de la caiguda de la lligadura del pedicul; perquè aleshores és tal la rapidesa am que d'ordinari ve la mort, que és impossible fer res. En els altres casos podrem encara treballar i fins vencer en situacions desesperades. Alguns cops l'hemorragia és catamenial, de proporcions reduïdes, i apareix molt temps després de l'operació.

Els symptomes de l'hemorragia són sempre acusats: hi ha precipitació del pols, la cara esblaimada, les extremitats fredes, el cos cobert de suors fredes; la malalta sent defalliments, una angunia subita i calfrets; se presenta també un elevament dolorós de les regions inguinals i un fort abaixament del replec de Douglas; i si s'havien posat tubos de drenatge, surt per llur boca la sang. En aquests casos no s'ha de temer obrir de nou el ventre; i si bé és cert que l resultat serà sovint nul, no hem d'oblidar els fets en que mercès an aquesta intervenció s'ha salvat a l'operada. Al fi i al cap basta tallar primer dos o tres punts de sutura pera investigar si hi ha o no derramament de sang. En Hofmeier, en un cas operat per en Schræder, i en ausencia seva, va obrir l'abdomen tres hores després de l'operació i va salvar la vida a la pacient: tot un costat del munyó s'havia separat de la lligadura i una petita arteria havia donat gran quantitat de sang; la va poder lligar i l'hemorragia s cohibí.

De totes maneres, serà precís esforçar-se en fer-se ben bé carrec dels symptomes abans d'intervenir, perquè s confonen en ocasions els propis de l'hemorragia amb els causats per una septicemia aguda o intoxicacions de divers ordre. Menos mal si d'aquella s tracta, car allavors també està indicat l'obrir el ventre. Però si s tractés d'una intoxicació medicamentosa, per exemple, seria perjudicial el fer-ho; i és positiu que a voltes sen donen casos.