

Així, en Martin cita l d'una malalta que caigué en colapsus la tarda del dia que la va operar; el pols era imperceptible, la respiració suspiriosa, les mans se refredaren i la temperatura s'elevà. Més, a pesar de que l quadro de l'anèmia era complet, no pogué decidir-se a admetre que havés cedit la lligadura del munyó pel molt cuidado am que l'havia fet, i va decidir esperar a veure l desenrotllo ulterior dels accidents. Cap al vespre sobrevingué agitació, se li donà una injecció de morfina, i, al despertar-se, el pols s'havia aixecat, desaparegué la suor viscosa i la temperatura va fer-se uniforme i normal. La malalta se va refer, però ls orins oferiren la coloració característica de l'emmetzinament per l'acid phenic.

Parlant ara d'altres phenomens que a vegades se presenten després de l'ovariotomia, dec citar en primer lloc els abcessos de la paret abdominal, a part de les parotiditis. Aquestes són rares i més aviat propries de la convalescència; però s comprèn que sempre indiquen un cert grau de septicèmia. Els abcessos són més freqüents, si bé ho són cada dia menos, a mesura que les pràctiques asèptiques se perfeccionen. Els uns són superficials i acostumen a fer-se al nivell de la sutura, deguts a faltes de neteja o a infeccions consecutives; se desenrotllen sobre tot en parets greixoses, i llur lloc predilecte és en la part baixa de la ferida, cap al mont de Venus. Pera curar-los no hi ha com obrir lleugerament la ferida am la sonda canalada i rentar el fogar am solució phenicada o sublimada, a més d'algun toc am solució forta de chlorur de zinc. Prefereixo aquest methodo an el den Martin, que tracta aquests abcessos am repòs, compressió lleugera i uniforme, am tiretes de diachylon i aplicacions renovades sovint de uata salicylica. Altres abcessos radiquen junt al pedicul o a les sutures perdudes en el ventre. Què hem de fer en aquest cas? Així que tinguem el convenciment de que s tracta d'una col·lecció purulenta fonda, i an això hi arribarem sobre tot per medi de la palpació bimamual i l'examen de la temperatura, ha d'obrir-se l ventre desseguida, treure l pus, netejar el fogar i procurar un drenatge facil i abundant.

Fòra de l'importància que tenen com a fets septics, ne tenen també aquests abcessos per lo que favoreixen la producció de les hèrnies o trencadures. Més també són aquestes ocasionades per vomits freqüents i forts, puix aleshores els budells trenquen la resistència que ls ofereix la linia de sutura i, fent saltar un o més punts, se presenten a l'exterior. Pera evitar això, el medi més apte, encara que no dongui seguretat absoluta, és tenir molt