

travers de la paret abdominal i després pel rectum; i al cap d'algun temps se va veure passar per l'orifici de la paret abdominal, ademés del pus, algunes materies fecals. La fistula va curar espontaniament. En Bryant va observar en un cas els fils de lligadures esser trets alguns mesos després de l'operació per un anus contra natura situat en l'angul inferior de la ferida. En un cas den Spencer Wells, el pedicul, en el que s'havien posat fils de lligadura tallats curt, havia sigut ficat endins; però un fil, que havia sigut posat al voltant d'una forta adherencia situada en la fossa iliaca esquerra, tenia un cap passat per la ferida abdominal. Se va veure espargir-se a lo llarc d'aquest fil, primer una mica de pus, després materies fecals. La malalta va morir vuit mesos més tard. En l'autopsia s trobà, entre l'òs iliac, el rectum i la vora esquerra del budell, una cavitat plena de pus, que d'un costat comunicava amb el rectum i de l'altre am les anses intestinals. Després, coneixem les observacions den Atlee, den Olshausen i den A. Doran.

«És raro que l'obertura del budell sigui prou accessible pera que s pugui tancar-lo amb ajuda d'una cauterisació o d'una sutura. Si l canal intestinal és, no solament destruït en un punt de sa paret, sinó que ademés presenta un esperó, cal intentar la reunió fent l'operació de l'anús contra natura (destrucció de l'angul sortint, per medi de l'instrument den Dupuytren, etc.). Si la fistula intestinal és massa profunda, comunica amb un abcés intra-abdominal per un llarc trajecte fistulós. En aquest cas, un deu limitar-se a cuidados de netedat i vigilar que no hi hagi retenció dels productes segregats per la ferida. La fistula s curarà a vegades espontaniament, com en els casos de Keith, Atlee».

Com a complicació també rara, però també important, tenim l'uremia, deguda a la congestió dels ronyons efecte de l'anestesia i del traumatisme, així com poden presentar-se phlebitis i embolies.

S'ha citat també l tetanos; però, tal com està avui dia la ciencia, la manera i disposició dels llocs aon se fan les operacions, i sobre tot en condicions climatologiques com són les de nostra terra, crec molt, però molt difícil, que aquest procés arribi a presentar-se.

Un cop efectuada la castració, i com a conseqüència remota de la mateixa, sobrevénen en la dòna una serie nombrosa de trastorns, referents a l'inervació, nutrició, etc., que revesteixen