

## EL TAMPONAMENT INTRA-UTERÍ QUE ES EXACTAMENT? COM EL FAREU? QUAN EL FAREU?

per **P. BAR** (1)

PROFESSOR AGREGAT A LA FACULTAT DE MEDICINA DE PARÍS  
LLEVADOR DE SAINT-LOUIS

*Què es exactament?* — És el tamponament del còs uteri i no solament el del coll o del segment inferior. Deu fer-se la distinció, car l'única dificultat que trobareu quan voldreu practicar-lo immediatament després del part, consistirà precisament en fer penetrar la glaça en el còs uteri mateix i fins al fons de sa cavitat.

*Com el fareu?* — Immediatament després del part, l'únic instrument útil serà una llarga pinça sense morsos, sense cremallera de fixació. Si voleu practicar-lo a l'endemà del part, tingueu una valva i una pinça estira-bala que sentirà i fixarà l llavi anterior del coll. El tampó serà fet amb una llarga bena de glaça iodoformica al 20°, ample de 5 centimetres, llarga de 10 a 12 metres. És comoda que aquesta bena no sigui enrotllada, sinó plegada d'aital manera que basti estirar pel seu extrem pera que s desplegui regularment. Alguns apothecaris preparen aquestes benes en flascos *ad hoc* i l'ús n'és més facil.

Així tenim l'arsenal. Pera tamponar l'uter immediatament després de la deslliurança, poseu la malalta a través del llit, renteu la vulva, netegeu la vagina, expremeu de l'uter les glebes que s'hi troben, introduiu dos dits de la mà esquerra en la vagina: penetren en el canal cervical i senten, gracies a la pressió que un ajudant exerceix sobre l'uter, l'orifici inferior del cos uteri o anell de Bandl. La mà dreta agafa am la pinça l'extrem de la bena i l'introdueix al fons de l'uter, hi fa penetrar gradualment la bena, sense forçar; aquesta omple l segment inferior, després la vagina, i 7 a 10 metres basten.

Si apliqueu un tampó després d'un rasclament practicat dos o tres dies després del part, agafeu el llavi anterior del coll amb una pinça estira-bala, un ajudant estira suaument portant la pinça cap-a-davant i un xic cap-a-dalt, poseu dos dits de la mà esquerra en el llavi posterior, i sobre ells o sobre una valva introduiu la bena en l'uter, agafant-la com abans, i termineu tamponant la vagina. El tampó restarà en lloc 24 a 36 hores. En aquest moment, treieu-lo, i, segons les circumstancies, reemplaceu-lo per un tampó vaginal o per un nou tampó uteri.

*Quan fareu el tamponament?* — L'indicació major és l'hemorragia primitiva, per inercia, per ferida vaginal, l'hemorragia secundaria.

El tamponament s'ofereix també com un medi de drenar l'uter en el cas d'infecció.

En el cas d'inercia, si l'hemorragia és grave, l'uter distès, buideu

(1) *Journal des Praticiens.*