

munyeques, contra les febres d'accessos. De tot temps, en els camps, s'han fet servir les fulles trinxades com manxiules. Segons sembla, els medicants se produïen abans llagues amb aquesta planta; i Murray, en un cas, vegé l'ulceració de la pell, la denudació dels tendons i la formació de cicatrices vicioses.

En Cazin ha provat de fer servir aquesta planta com manxiula i ha obtingut vesicacions.

GATA RABIOSA (provincia de Girona).—*R. bulbosus* L.—Espanyol, *Yerba velluda*; fr., *Bacinet*, *Clair-bassin*, *Rave de Saint-Antoine*, *Pied de coq*.—En alguns prats, camps humids, llocs montanyosos del litoral a la regió sub-alpina, *Csta.*—Abril, etc.—És una especie perillosa. Les fulles produeixen en la pell rubifacció i phlyctenes. En el tubo digestiu determinen forta inflamació lo mateix que n els ronyons, ralenteixen el pols i la respiració, causen trastorns nerviosos i sovint la mort.

A l'exterior s'han usat les fulles trinxades, l'aigua destilada, l'oli i la tintura alcoolica. Am les fulles se formen phlyctenes en mitja hora; l'aigua destilada és més activa i la tintura més tardana. Am l'oli sols s'obté al cap d'un a tres dies una rojor de tres o quatre dies de durada. En Poli (1) ha empleiat amb exit topicament aquestes preparacions en les gastralgies, dyspepsies, laryngitis i tracheitis chroniques, en la tós i l'aphonia i en les ciatiques chroniques. Al dir d'ell, la curació fou completa en 30 casos de ciatiques als quals va fer aplicacions d'aigua o de tintura en la pell del taló. També en Nardo i en Freschi, a l'hospital de Cremona, obtingueren durant alguns anys resultats avantatjosos.

A l'interior s'ha d'anar am molt cuidado en l'ús d'aquestes preparacions. En Gilibert i altres autors han preconisat l'ús del suc de la planta, a la dosi de 2 grams per un litre d'aigua, com aperitiu, desobstruent i tónic.

RANUNCULUS ACRIS L.—Fr. *Bouton d'or*, *Patte de loup*, *Piecot*.—Pels llocs herbosos desde l litoral de Barcelona, etc., fins a montanya; pels boscos de Berga, *Csta.*—Maig, Juliol.—Especie verinosa; produeix els mateixos phenomens toxics de l'anterior. S'ha usat també en preparacions identiques; però a l'interior ja ningú l'empleia. A l'exterior s'han utilisat en el tractament de la tinya, ulceres dolentes i atoniques, el poagre, el rheumatisme chronic i el paludisme.

R. ACONITIFOLIUS L.—Fr. *Boulon d'argent*.—Boscos de Se-

(1) *Dict. Dech.*