

galés, *Grau*, a Vilallonga, *Isern* i *Csta.*, i als Pyreneus, *Bolós.*—*Maig*, etc.—S'ha usat en el tractament de la ronya, del poagre, de l'asthme, cephalalgia i paludisme.

R. THORA L.—Pels Pyreneus i en les cercanies de Berga, *Grau*; per Pobla de Lillet, etc., *Csta.*—Juny i Juliol.—S'ha tingut sempre per planta molt verinosa, i se diu que ls gals ne posaven el suc a les fletxes, produint així ferides que s gangrenaven rapidament.

R. GLACIALIS L.—Montanyes de Nuria, de Nou-fonts fins al naixement del Freser, *Salv.* i *Csta.*; Maladetta, *Gren.*, *Godr.*—Juliol.—La gent de montanya l'usa com diuretic i bon remei en el reumatisme i les pleuresies.

R. ALPESTRIS L.—Pyreneus centrals, Port dels Francesos i baixada a la Penya Blanca, *Zeit*; Vall d'Aran, *Isern*. En *Costa* diu que solament l'ha vist en la regió alpina.—Juny, Juliol.—L'arrel és purgant i els caçadors l'usen contra la fadiga i els vertics.

R. PHILONOTIS Ehr.—En els prats, *Salv.*; a Can-Tunis, *Isern*; i pel prat del Llobregat, *Csta.*—Abril, etc.—Els metges grecs l'ordenaven contra les dermatosis i el *mal-de-caixal* i com esternunatori. Se diu que pot-ser és el Βυτραικίου ἔσπερον de Dioscoride.

FICARIA, MOUCH

(cat., esp. i it., *ficaria*; fr., *ficaire*; al., *feigivarzeuranunkel*)

Genre de plantes que s distingeixen per flors trimeres amb els petals de la corola exterior desdoblats.

FICARIA.—R. *Ficaria* L.—Esp., *Ficaria*; fr., *Ficaire*, *Grencuilette*, *Eclairielle*, *Ganille*.—Creix espontaniament pels jardins; se la troba pel pla de Barcelona i Devesa de Girona, *Salv.* i *Csta.*; i per Olot, *Teix.*—Hivern, primavera.—Els antics la prescrivien com antihemorroidal i antiescrofulosa; i pels resultats obtinguts recentment per en Burnet i en Neuhansen en les hemorroides sembla que, en efecte, no mereix que se la deixi en oblit. Van Holsecq (1), que també l'alaba, usa les següents dosis: decuit, infús, fumigació, de 50 a 60 grams per litre d'aigua. Aixarop, 1 per 2 d'aigua i 5 de sucre; 50 grams en poció. Extret, 1 per 6 d'aigua; de 1 a 4 grams en pindoles i en bols. Polç: de 2 a 4 grams, en pindoles i en bols. En Stanislas Martin, apothecari de París, ha extret dels tuberculs una substancia mal definida, que anomena *ficarina*, i la proposa a la dosi de 2 grams

(1) *Bull. de Ther.*, vol. LVI, pag. 540.