

curable si s'intervé a temps (icterícia toxica). Am tot, l'icterícia toxica pot no esser més que l primer grau o l primer efecte d'una intoxicació generalisada de les més terribles.

(Seguirà)

Analysis

VULVA I VAGINA

A. BARSOUKOFF.—Necrosi del terç superior de la vagina.—(*Société d'Obst. et de Gyn.*, 1898.)

Se tracta d'una malalta entrada a l'hospital emmetzinada per l'acid sulphuric. Als vuit dies d'estancia en l'asil se presenta una lleugera hemorragia vaginal, i quatre dies després l'autor treu un troç cilíndric de teixit gangrenat de la vagina de la malalta, sens que hagués sobrevingut ni en un sol moment gens d'elevació termica. L'aspecte i extensió del fragment després, que comprenia tota l'espessor de la paret vaginal i una part de teixit cel·lular sub-jacent, féu suposar que s corria en aquest cas tot el perill inherent a una vaginitis dissecant (*colpitis dissecans*), quedant la causa de la necrosi desconeguda, puix la malalta nega energicament haver-se sotmès o fet per ella mateixa algunes manipulacions vaginals. En aquest cas no és d'esperar que vingui una estretor considerable de la vagina.

A més del present cas clinic l'autor ha tingut ocasió d'observar per tres vegades més la necrosi de la vagina, sobrevingudes les tres al començament del quart septenari de la febre typhoidea, o siga quan la temperatura ha ja entrat en el període de descens. Malgrat l'extensió de les lesions, fa constar que en cap d'aquestes malaltes vingué una estretor vaginal de tal entitat que no permetés veure facilment el coll de l'uter am l'ajuda d'un speculum.

A. ABRAJANOFF.—I. Quyste vaginal. II. Cancer del clitori i dels llavis.—(*Journal d'Obstétrique et de Gynécologie*, 1898.)

Abrajanoff conta un cas de quyste de la vagina, curiós per lo estrany. El trobà en una malalta nulípara de 30 anys d'edat, ben reglada, que s queixava d'un fort dolor en les epoques menstruals, dolors somorts en el baix ventre, freqüents ganas d'orinar i evaquacions ventrals irregulars. L'examen directe va descobrir, agafat a la paret posterior de la vagina, un quyste, gros com una poma, que sortia per entre ls llavis de la vulva quan la malalta feia algun esforç. Com a tractament escindí l tumor, venint la reunió per primera intenció, logrant que desapareguessin completament tots els symptomes.

Un altre cas observat pel mateix autor és el d'un cancer (cranc) del clitori i dels llavis en una dona de 62 anys. Conegué la malalta sa malaltia per la vermellor que anaven prenent i la picor que li feien els orguens genitals externs, ja sis mesos abans d'entrar a l'hospital, apareixent alguns mesos després un tumor vermell, carnós, que, ocupant el clito-