

ri, se propagava cap al terç superior dels petits llavis i el vestibol per sota de l'orifici extern de l'uter. El tumor fou extirpat, recidivant al cap d'uns quants mesos. Degut an això acaba sentant l'autor que l pronostic del cancer del clitori deu esser molt més accentuat que l del cancer que arrelen en altres parts dels orguens genitals externs, i que per consegüent és precis en el ptimer cas extirpar molt més troç de teixit bo que en el segon.

#### UTER

LAMBRET.—Uter mal conformat pres per una lesió dels annexes.—  
(*Gaz. des hôp. de Toulouse*, 1898.)

Poden confondre-s els annexes emmalaltits amb una appendiciti, una salpingiti localisada a la part superior, una adheniti pelviana, am les anses intestinals soldades entre elles, etc., havent-se també pogut senyalar la causa d'equivocació en que s troba l'autor d'aquesta observació.

Se tracta d'una dona d'uns vint anys d'edat, sense perdues de cap mena i si am sofriments habituals mentres durava la menstruació i al fi de la mateixa.

Pel tacte a la dreta se reb am claretat la sensació d'un tumor separat de l'uter per una depressió. A l'esquerra l fons de sac és lliure com en estat normal.

Decidida l'operació, s'escullí la via abdominal a fi de portar a cap una intervenció que fos lo més conservadora possible, respectant els annexes del costat esquerre si en ells no s trobava una alteració ben definida. Posada la malalta en la posició de Trendelenburg, se comença per fer una petita incisió en la part mitja del ventre, introduint per ella la mà a l'objecte de desenganxar amb els dits el tumor colocat a la dreta de l'uter. Tret a fòra l ventre aquest tumor pera examinar-lo directament, presenta un aspecte llis poc comú en un ovari que no hagi jamai funcionat. Tornat a ficar el tumor dintre l'abdomen, am molta netedat i sense que pugua cabre dubte s'aprecia la depressió que l separa de l'uter; se l torna a fer sortir després pera fer-li un tall transversal que descobreix un teixit dur, d'aspecte muscular, molt semblant al teixit uterí; incisió que condueix a una cavitat tapiçada per una mucosa i plena tota ella de sang. Continuant la ressecció s troba a 5 centimetres un petit bloc que no és altra cosa que l'ovari atrophiat. A l'arribar an aquest temps operatori pot convence-s l'operador que lo que té al davant no és altra cosa que un uter mal conformat, unicorn, ja que l *corn* dret no existeix pas, insertant-se l lligament llarg rudimentari a la part mitja de l'uter.

En la mala formació que hem descrit el corn atrophiat presentava en sa part mitja un aixamplament qual secció recordava l'aspecte del muscul uterí. Al venir la menstruació se congestionava l tumor, deixava escapar petites quantitats de sang i es formaven al seu voltant regions de peritoniti localisada causa dels dolors que sofria la malalta.

J. GOUZARTSCHIK.—Drenatge capillar de l'uter en les endometritis dels sobreperts (post-puerperals).—(*Journ. d'Obst. et de Gyn.*, 1898.)

L'autor proposa que s'operi de la següent manera: després de tenir al descobert la porció vaginal am l'ajuda d'un especulum de Collin, s'es-