

VARIA

KRUGER (BERLIN).—L'appendiciti i ses relacions amb els orguens genitals de la dona.—(*Deutsche Zeitschriſt. f. Chirurgie*, XIV, 3 i 4.)

Estudia l'autor en son treball el diagnostic diferencial entre l'appendiciti i les malalties dels orguens genitals de la dona; diagnostic molt facil d'equivocar.

La parametriti puerperal aguda que esclata amb els mateixos phenomenes que l'appendiciti perforant, se diferencia per l'ausencia o falta de desarreglos generals graves i de peritoniti difusa.

Més dificil resulta l diagnostic diferencial entre l'appendiciti am perforació i la ruptura d'una cavitat o bossa purulenta de la regió genital.

Els exudats parametricis i paratyphlitics limitats poden, baix l'influencia curativa, perdre llurs formes i situacions caracteristiques; de totes maneres és lo corrent que la massa principal en l'exudat paratyphlitic arrelhi al nivell de l'òs iliac, deixant lliure la part mitja del lligament ample.

Les lesions dels annexes se reconeixen per estar unides a l'uter per un cordó bastant groixut.

Majors són les dificultats en el diagnostic quan se tracta de lesions comunes als annexes i l'appendiç. L'autor recorda 21 observacions d'aquesta classe, les unes d'afeccions senzilles que donaren lloc a equivocació, les altres d'afectes complicats, supuracions dels orguens genitals en el curs d'una appendiciti operada o no, i fins dos casos d'embracç ectopic amb inflamació de l'appendiç i adherencia a la fossa ovular.

Interessantissim resulta l següent cas, recullit pel mateix autor: malalta a la qui se li obra una gran cavitat purulenta en el fons de sac posterior, quatre semmanes després d'operada d'appendiciti, tenint en compte que a l'operar-la pogué fer-se constar l'integritat en que s trobaven els orguens genitals.

En un segon cas acabat per la mort de la malalta, l'autopsia descobrí una pelvi-peritoniti am colecció purulenta de la trompa. En una altra dona l'exudat paratyphlitic causà la perforació de la bufeta. Una noia tingué d'esser operada a causa d'un abcés en l'ovari esquerre tres mesos després d'haver sigut operada d'appendiciti. Una altra vegada fou precís, tres semmanes després de l'operació de l'appendiciti, donar sortida per incisió a un exudat que feia relleu en el fons de sac posterior.

Noticies

El Dr. D. Lluís Segalà Estalella, distingit professor auxiliar de l'Universitat de Barcelona i germà de nostre molt estimat amic i company de Redacció en M. Segalà, ha sigut proposat, per unanimitat, pel tribunal d'oposicions, pera la catedra de llengua grega, vacant a la Facultat de Philosophia i Lletres de l'Universitat de Sevilla.

Amb ell són cinc els catedratics de llengua grega que han sortit de les aules d'aquesta Universitat, ocupant respectivament