

Vi de Chassaing

Bi-digestiu

A la pepsina i a la diastasa



pepsies particularment. Se l pren a la dosi d'una o dues copetes de licor després de cada menjada, pur o amb aigua.

Cada copeta de licor conté: 0'20 grams de Pepsina Chassaing; 0'10 grams de Diastasa Chassaing

Aquesta preparació, que en 1864 ha sigut l'objecte de un informe favorable a l'Acadèmia de Medecina de París, se prescriu desde nous nombrosos anys contra les diferents afeccions de les vies digestives, les dys-

Fosfoglycerat de Calç pur Neurosina Prunier

RECONSTITUENT GENERAL DEL SISTEMA NERVIOS

La Neurosina Prunier, presentada baix tres formes diferents, se pren en general a les dosis següents, abans o durant la menjada:

- 1.^a Neurosina Prunier-aixarop, 2 o 3 cullerades grans per dia.
- 2.^a Neurosina Prunier-granulada, 2 o 3 culleradetes per dia.
- 3.^a Neurosina Prunier-osties, 2 o 3 osties per dia.

Cada culleradeta gran d'aixarop, cada culleradeta de granulat, cada ostia, contenen 0'30 gr. de fosfoglycerat de cal pur.

Diposit general: 6, Avenue Victoria, PARIS

FOSFATINA FALIÈRES

La Fosfatina Falières és l'aliment més agradable, el més recomanat pera les criatures desde l'edat de 6 a 7 mesos, sobre tot en el moment de desmamar-los i durant el periode de creixença. Facilita la dentició, assegura la bona formació dels ossos, etc. : : :