

## CONCLUSIONS

I. No existeix, en veritat, un typo clinic que s pugui anomenar categoricament bogeria post-operatoria.

II. El paper més important en la genesi dels trastorns mentals està encarregat a les predisposicions hereditaries o adquirides, exceptuant la tiroectomia i certes operacions que tinguin lloc sobre del crani.

III. En la producció d'accidents poden obrar diferents causes:

a) Les intoxicacions internes o externes, alcoholisme, infecció, auto intoxicació.

b) El xoc moral; la preocupació.

c) Els anesthetics, antiseptics, anèmia, caquexia. No tenen més que una importància molt secundària.

IV. Sembla no ésser cert que les operacions gynecologiques exposin més que les altres als trastorns psychics post-operatoris.

V. Aquests són molt poc freqüents després de les operacions.

VI. Varía molt l'epoca de la llur aparició.

VII. L'evolució i son pronostic depenen de la causa productora i de la forma que presenten, devent-se considerar, baix aquest punt de vista, cada cas en particular.

Traduit per J. PIN

---

## Secció polylogica

### DEL TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI PULMONAR PER LA SERUMTHERAPIA

PEL PROFESSOR MARAGLIANO (DE GENOVA) (1)

Les enquestes experimentals i l'observació clinica permeten l'exposament d'una serumterapia contra la tuberculosi, devent-se mirar la qüestió baix dos punts de vista: el laborator i la clinica.

Baix lo primer punt s'ha de:

a) Preparar les metzines que s'han d'injectar als animals.

b) Demostrar i midar les antitoxines existents en el xerigot.

c) Cercar l'acció de dites antitoxines sobre l'infecció i sobre ses conseqüencies.

Se troben dintre ls cultius dues categories de metzines: les *proteines* i les *toxialbumines*, i pera obtenir de la millor manera possible proteïnes actives el medi més adequat és el d'extreure-les de l'aigua

(1) *Presse méd.*