

diments de defensa de l'organisme en el cas de curació espontània analògica demostrada:

1.<sup>o</sup> Per la presència d'antitoxines en la sang de l'home en bon estat de salut.

2.<sup>o</sup> Per la producció d'antitoxines, en l'home, injectades amb les metzines tuberculoses.

3.<sup>o</sup> Per la presència d'antitoxines en l'organisme dels malalts en els quals la tuberculosi s cura espontàniament.

L'acció del serum està demostrada, referint-se a l'home baix el punt de vista clínic:

a) Per la baixa de la febre.

b) Per la desaparició dels bacillus en la saliva.

c) Per la curació dels fogars bronco-pneumònics.

4.<sup>o</sup> L'acció terapèutica del serum és complexa i s'exerceix sobre les metzines i sobre ls bacillus de la tuberculosi.

5.<sup>o</sup> Sobre tot perquè no desapareix tant sols la toxinemia, sinó també ls bacillus, amb aturament i fins curació del procés morbós.

L'examen de 1,362 observacions clíniques justifica l'aplicació del serum a la terapèutica de la tuberculosi humana.

Pera apreciar equitament l'acció terapèutica del serum és necessari acostumar-se a diferenciar les formes clíniques de la tuberculosi i fixar exactament els termes clínics en els quals se creu poder demostrar raonablement la curació del procés morbós.

---

## Analysis

### PATOLOGIA GENERAL

BRUIK (LEIDEN).—L'escara produïda per un cauteri és apte pera impedir l'infecció?—(*Centralbl. f. Gynäk*, 1898, i *Rev. de Gynec.*, Juliol-Agost, 1898.)

L'autor ha notat incidentalment en el curs de ses enquestes experimentals sobre la gensi de les adherències en el peritoneu que s feia una proliferació microbica al nivell de les escars produïdes en aquest per cauterisació. Els germens se trobaven no sols en l'exudat que recubria l'escara, sinó també en totes les capes subjacents de la paret abdominal.

Pera aclarir el fenomen ha determinat amb el termo-cauteri una escara peritoneal de cosa de mig centímetre en un animal sà i amb totes les precaucions antiseptiques; i després ha depositat a la superfície de l'escara, cultiu virulent de stafylocoques. El ventre s tornava a tancar. Dos dies més tard se sacrificava l'animal i se sembrava en tubos d'agar subs-