

tància presa en l'escara i capes sub-jacents. Tots els tubos donaren un cultiu pur de stafylocoques.

D'això en dedueix que les escares per thermo-cauteri no són pas una barrera capable d'oposar-se a la penetració de microbis en els teixits sub-jacents a l'escara i que aquests micro-organismes poden viure vuit dies al menos en la superfície de l'escara. I, per analogia, declara que molt probablement les escares per thermo-cauteri deuen ésser també impotents pera privar l'infiltració dels teixits sub-jacents pel suc cancerós en el cas, per exemple, aon un s'és servit del thermo-cauteri pera operar en mig de teixits invadits per la carcinosi.

VULVA I VAGINA

C. H. STRATZ (HAAG).—*Dos nous especulums. — Les irrigacions calentes.*—(*Centralbl. f. Gynäk*, 1898, n.º 17.)

L'autor ha fet construir els dos especulums inspirant-se en models vells caiguts en desús. L'un és tot de vidre i format per una valva concava qual canal se continua en angl dret am la llum d'un gros tubo formant manec; i estant destinat a les cauterisacions del coll o de la cavitat uterina am líquids més o menos irritants i colorats. Com se comprèn, té l'avantatge de protegir la vagina, la vulva i el periné de la dóna i la mà de l'operador, d'ésser inalterable i de poder-se netejar bé, i de donar-se compte de la coloració i naturalesa dels líquids que surten de la vagina durant l'irrigació post-operatoria.

El segon és pera irrigacions calentes de gutta-perxa i té la forma d'un de Fergusson qual pabelló fos molt obert i excavat a manera de copa. La vora superior de la pseudo-copa s continua amb un llarc manec que permet a la malalta sostenir ella mateixa l'instrument, i en conseqüència donar-se les injeccions; i la vora inferior s'allarga lleugerament com una canal. Aquest instrument protegeix per complet la vagina, la vulva, el periné i l'anus contra l'acció de l'aigua a 40º. En Strats ha pogut elevar la temperatura del líquid de les injeccions a 50º i arribar aixís a curar en quinze dies voluminosos exudats perimetritics.

G. RJETSCHKOVSKY i S. SIRKINE SCHKLOVSKY.—*Hypospadies incomplet, imperforació de l'hymen i hematocolpos.*—(*Vratch*, 1898, 3.)

Noia de 19 anys; menstruava desde ls 14 regularment amb abundància i sense dolor; fa cinc mesos que van desaparèixer les regles, i desde aleshores notà sensació de pes en el recte, dolors als lloms i estat general bastant delicat.

Al fer l'examen se troba l'hymen imperforat i un xic aprimat al bell mig. El meat estava dilatat. Pel tacte rectal se nota un tumor tou en la vagina. Si s'apreta al mateix temps sobre l'hymen i pel recte, se fa sortir un xic de sang per l'uretra, essent els orins molt clars al sondar-la.

A l'incisió de l'hymen sortiren 150 grams de sang negra. El líquid injectat a la vagina pera rentar-la s va escorrer pel forat de l'uretra. Allargada l'incisió, per l'exploració s va veure que l'uretra s'obria a la vagina, havent-hi un hypospadies incomplet. La malalta s tornà a examinar dos mesos més tard, podent-se veure que l forat vaginal de l'uretra s'obria, d'una part per fora, i per l'altra en la vagina; i degut an això