

L'uter estava absolutament sà; la mucosa no era ni fungosa ni estovada; les trompes i els ovaris no oferien cap lesió apreciable; tampoc existien adherències patològiques.

UTER

FR. BARRUCH (BERLIN).—*Atrophia completa de l'uter a causa de la vaporisació d'aigua calenta.*—(*Centralbl. f. Gynäk.*, 1898, n.º 5.)

Malalta de 28 anys sotmesa a una sola sessió de vaporisació per a combatre metrorragies abundants que vingueren quatre mesos i mig després d'un part normal i s'prolongaren durant vuit setmanes. Les regles foren suprimides; però molt poc temps després la dona presenta un gran força dolors de cap, bufades d'escalfor, palpitations i demés symptoms de la menopausia anticipada. A l'examen, se va trobar l'uter absolutament atrofiat i esclerosat, fixat en retroversió i sense cavitat. La vulva i la vagina estaven bé; els annexes no s'pogueren explorar.

BECKMAN. — *Cancer i embraç.* — (*Rev. de Gynec. et de Chir. abd.*, 1898.)

En Beckman cita dos casos d'embraç complicat amb cancer del coll de l'uter. En la primera malalta li practicà l'hysterectomia a la setima setmana de l'embraç; la segona parí a terme i se li va fer l'hysterectomia quinze dies després. Els resultats foren excelents.

TROMPES I OVARIS

Q. BOULLY.—*Tumors solids dels ovaris.*—(*Rev. de Gynec.*, 1898.)

L'autor ha tingut ocasió d'extreure dugues vegades tumors solids de l'ovari de naturalesa histologica maligna que tenien macroscopicament l'aspecte de fibromes de l'ovari.

En un cas, clinicament el tumor s'havia portat amb tota la malignitat dels tumors abdominals més malalts: ascitis enorme punccionada diversos cops, caquexia abdominal, edema dels membres, infeccions i amenaça de mort proxima. La laparotomia va curar el malalt amb 15 dies; i la curació s'ha mantingut desde quatre anys. Segons Gombault, se tractava d'un tumor epitelial de l'ovari de pronostic molt reservat.

En el segon cas se tracta d'una malalta que tenia dos tumors solids dels ovaris, d'apariencia fibromatosa i classificats hystologicament per en Picherini com *fibro-sarcomes*. L'operació va resultar facil; però al cap de dos mesos la petita pelvis estava plena de tumors recidivants, i actualment la malalta està morint-se, sis mesos apenes després de l'intervenció.

L. N. KANNEGUISSE.—*Dos casos de sarcoma dels ovaris.*—(*Soc. de Gyn. et d'Obst. in Gazeta Bolkina i La Gynec.*, 1898.)

La primera d'aquestes dues observacions és interessant, perquè se tracta d'una noia de 16 anys: se notà l'tumor per primera vegada fa