

alguns mesos: llavors era gros com dos punys. Els dolors i el volum del tumor augmentaven rapidament; a l'operar-la, el tumor tenia l'tamany d'una criatura de 7 a 8 mesos. En el segon cas se tractà d'una dona de 45 anys, nulipara.

M. K. HENRICHSEN.—**Quatre casos de cossos estranys en els orguens genitals de la dona.**—(*Soc. de Gyn. et d'Obstet. de Saint-Petersb. in Gazeta Botkina i La Gynec.*, 1898.)

1) Noia de 19 anys. Calcol en l'uretra. En l'operació s trobà una agulla de ganxo.

2) Dona de 35 anys. La tancadura del pesari de Zwang s'havia incrustat en la paret vaginal. Per treure-la van tenir d'emplear-se eines de manyà.

3) Dona jove i casada. Tenia ls grans llavis atravesats per uns filferros d'or fent anella en les puntes i tancat amb un candau que s podia obrir o tancar am clau. Segons va dir ella, el seu marit gelós l'hi havia aplicat aquest «cinturó de castetat».

4) Una agulla en el coll de l'uter. Feia dos anys que hi era, sense haver privat un embraç i un part

H. C. COE.—**Quiste desenrotllat en una porció d'ovari deixat després d'una operació conservatriu.**—(*New York Obst. Soc. i La Gynec.*, 1898.)

En Juny de 1896, H. C. havia operat a una jova multipara que sofria de dolors persistents i dismenorrhea, seguidès d'una salpingitis gonococica.

Les dues trompes i els dos ovaris estaven augmentats de volum, molt movibles i fortament adherents.

Se féu el raspat de l'uter, colpotomia i ablació de l'ovari i trompa esqueres. L'ovari dret, que sembla quasi normal, fou simplement separat de ses adherencies. En quan a la trompa, se limità a ressecar-la, deixant-la de manera que l'orgue conservés sa permeabilitat.

No trobà alivi la malalta, ni per l'operació ni pels cuidados consecutius, torundes d'ichthyol, electricitat, etc.: sempre s queixava de dolors més o menos forts en el costat dret. Les regles, encara que regulars, eren tant doloroses com abans.

Examinant-la no s trobava res més que un poc de sensibilitat en l'ovari dret. Alguns mesos més tard els dolors vingueren tant forts que la malalta demanà l'aliviessin a qualsevol preu. En aquest temps se trobava una massa grossa com una taronja en el corn dret.

Raspat, laparotomia i ablació d'un quiste un poc adherent: no quedaven senyals de la trompa de l'ovari dret.

Convalescencia completament normal; se presentaren les regles en son temps i sés dolor, continuant essent regulars.

Aquest cas és interessant perquè confirma l fet notat ja per Martin que, després de les operacions conservatrius en els ovaris, la porció de estroma que hi queda pot esser un començament de degeneració quística que necessita una segona operació. No és pas aquesta la primera vegada que l'autor ha notat, després d'operacions d'aquestes, en les que s'interessa molt, la funció menstrual restablir-se molt normalment, més continuant sofrint les malaltes, que tornen demanant una operació més radical.