

*Eg. Grandin* cita quatre casos en que troços d'ovaris i de trompes se deixaren en son lloc pera estalviar a les malaltes els symptomes molestos d'una menopausia prematura en els quals les malaltes s'han trobat pitjor que abans de l'operació. Elles no tenen regles, en lo veritable sentit de la paraula, sinó que perden per intervals i sofreixen de sos munyons. Preveu que s veurà obligat a fer operacions secundaries. En el camí de la conservació no s deu anar massa enllà: si hi ha dos o tres quistes en un ovari no val pas la pena de tocar-lo; més si està ple de quistes deu tallar-se. Si a la dòna li continüen els dolors després de l'operació, és que aquesta ha sigut insuficient.

*Vineberg*.—Les intervencions conservatrius en els ovaris tenen tal importancia que un no deu deixar-se impressionar per alguns casos desgraciats. En els ultims anys ell les ha fetes en gran nombre de casos de cirurgia ultra-conservatriu, havent tingut tres o quatre casos dolents entre nombrosos exits lo més satisfactoris. És cert que encara falten alguns punts per precisar l'elecció de l'oportunitat de la operació més o menos radical.

*Iewel*.—És en el curs de l'operació quan se pot bonament apreciar fins a quin punt se pot esser conservador en el tractament de les trompes i dels ovaris. Un petit troç de teixit de l'ovari és suficient pera conservar la funció sexual, essent molt raro no poder-lo trobar.

V. JACOBSON.—Cancer primitiu de les trompes de Fallopio. — (*Journ. akouchi i genskich bolezi*, 1898.)

Dòna de 45 anys. Entrà en la Clinica presentant secrecions uterines, cephalalgies, vahidos i dolors a l'hipogastri. A l'examinar-la s trobà un tumor dels annexes esquerres, immòbil i tou. L'ablació fou feta pel fons de sac de darrera la vagina, pòdent-se dir que l tumor no era altra cosa que la trompa. Mentres se separava, es va rompre, sortint unes masses semblants a cervell.

Am l'examen histologic se confirma la naturalesa maligna del tumor. Consten que l forat uterí de la trompa, l'ovari, la mucosa i la serosa uterina estaven intactes, havent d'admetre que l tumor salpingiós era primitiu. El quadro clinic d'aquests tumors seria l següent:

S'observa, generalment, en les nulipares de 43 a 60 anys. Les malaltes se queixen de dolors en el costat corresponent del ventre i cuixa de la mateixa banda. Aquests dolors am freqüencia són paroxistics i acompanyats d'una forta secreció serosa que s'escorre per les parets genitals (sactosalpinx carcinomatosa profluens de Slaviansky). El volum del tumor que s percepbeix a l'exploració és del gruix d'un ou de colom al d'un cap de fetus. El neoplasma és generalment unilateral i am preferencia s desenrotlla en un terreny inflamatori.

F. A. KEHRER (HEIDELBERG).—De l'esterilisació per la secció de la trompa per la via genital.— (*Centr. für Gyn.*, i *La Gynec.*, 1898.)

En tots els casos ont està indicat impedir tota possibilitat d'embranch (malaltes de l'uter, pelvis estreta), l'autor aconsella una operació per ell feta tant sols una vegada. Després d'incindir el fons de sac vaginal anterior i de tirar endavant el fons de l'uter, passa dos fils per sobre les trompes, tallant entre les dues lligadures. És precís, naturalment,