

preses de glaça impregnades d'aquest decuit, i adhuc en alguns casos escampant-hi una barreja de camphora i quina; cura que deu fer-se sobre tot si per cas se presenta la gangrena humida. En aquest cas convé fer-la am freqüencia i anar separant am les estisores les parts podrides; en cambi, si és la gangrena seca la que s presenta, les cures no deuen fer-se tant sovint, procurant no tocar la ferida fins alguns dies després de l'operació, a menys que l'apòsit estigui tacat o la febre ns indiqui la possibilitat d'una complicació local.

El pedicul se desprèn dels vint als trenta dies, quedant un clot bastant fons que se cicatriza més o menys tard, segons els casos; terme mig, cinc setmanes.

El tractament consecutiu a que deurà sometre-s la malalta després de l'operació variarà segons la complicació que s presenti, essent la peritonitis la més freqüent i la que fa sofrir més decepcions: pera prevenir-la no hi ha com fer una bona netejada de budells, amb els purgants salins, per exemple. Els vomits són també una complicació que s presenta molt sovint, i pera combatre-ls devem fer ús principalment de begudes gelades i establir l'alimentació per la via rectal.

L'operació aquesta, així breument descrita, quins resultats ha donat? Posada al costat de la cesarea, a la que pretengué substituir, s'ha de confessar que sa supremacia no s marcava pas abans d'una manera decidida. Foren en un principi tant dolents sos resultats que la mortalitat amb ella fins pot-ser va superar a la de 81'48 per 100 indicada en 1880 per en Lefour com xifra de la cesarea. Després ha anat millorant; i ja al 1890 Pestatozza senyalava la de 50 per 100 en la de Porro en comptes del 66 per 100 de la cesarea.

En altres estadístiques l'avenç s'ha mostrat més fort. Així, a la den Truzzi, deixeble den Porro, s'hi troba un 39 per 100 de mortalitat, i en les den Breisky, den Leopold i de la Clinica Baudelocque arriba al zero. Bé és veritat que és escas el nombre d'operades que hi consten; però també cal defalcar de les altres els molts casos desesperats en que s'operà com recurs suprem. En la mateixa den Truzzi poden ben bé treure-s, com nota en Ribemont, dotze casos ja *in extremis* abans de l'intervenció; de manera que l tant per cent seria sols de 15'9. De tots modos, i malgrat tenir-ho en compte, crec que la xifra actual és encara més pujada i em decanto a acceptar com bastant exacta la de 20 per 100 que n Apfelstedt ha deduït de sos estudis. Més d'aquesta a la de 50 por 100 que l mateix autor dóna com positiva en la