

i insuficiència aortica, no tant en les estretors aortiques i lesions mitrals; quan sofreix bronchitis i afectes pulmonars o pleuritics més o menos chronics. L'estat de la celula nerviosa deu tenir-se en compte. Així, per exemple, en els ataxics se poden produir reflexes generalisats que donen lloc a retards del cor o respiratoris. En una paraula, tota lesió nerviosa o vascular. Quan és alcolic, no sols lo dit contra-indica l'empleu dels anesthesics, sinó també la mateixa indole de l'intervenció proposta, i també tenint en compte la regió en que s'ha d'intervenir, tals com les operacions sobre la llengua, pharynge, larynge i trachea, en no essent que per operacions previes o devegades sols fent adoptar posicions adequades se logri sortejar els perills que en sí entranyaven.

Respecte a la naturalesa de l'operació, cal anomenar, com a perilloses, la reducció de luxacions, ruptura d'anquilosis, fisura i fistula anal, tumors voluminosos del ventre, etc. L'estat del malalt també pot contra-indicar l'anestesia, tal com la depressió produïda per hernia estrangulada, ferides penetrants de pit i ventre, per arma de foc, consecutiva a grans traumatismes.

Ni l'sexe ni la poca ni molta edat, per sí sols contra-indiquen l'empleu dels anesthesics.

Després de lo dit estudiem el modo i forma d'anesthesiar, junt amb els datos que devem tenir presents pera evitar els accidents en tot lo possible; i, per fi, en cas de presentar-se, de quin modo deurem combatre-ls.

Abans de tot deu preparar-se l'malalt. Aquest estarà en dejú per espai d'unes 7 o 8 hores, a fi de disminuir les causes dels vomits que tant freqüentment se presenten.

Pera això, apart d'altres raons, és convenient operar durant les primeres hores del dematí. Haurà pres la nit anterior una poció bromurada a fi d'anesthesiar la mucosa de les vies respiratories, evitant així l'excitació de les mateixes produïda per l'anesthetic inhalat.

Abans de començar l'anestesia deu pinzellar-se la mucosa nasal amb una solució de cocaïna, i al propi temps se recobrirà nas i llavis amb el mateix objecte amb una substancia grassa: llar, oli, vasselina, etc.

Si l'operació ha d'esser llarga, serà molt convenient propinar al malalt morphina o narceïna per medi d'una injecció hypodermica, que a la vegada complirà l'indicació de compensar l'anemia cerebral relativa que ls anesthesics produueixen. No obstant, l'acció de la morphina serà diferent si l'individu està