

deturar va posar en imminent perill a la malalta, no compensa l temps que s pot perdre fixant lligadures en els teixits ja laminats. Hem d'esser practics.

En Doyen, en l'ultim numero de la *Revue de Gynecologie*, *reventa*, si val la paraula, el methode, posant al descobert sos origins i ses dolentes conseqüencies. Demostra que l'angiotribe no és més que una modificació de la seva pinça-clamp, feta després que dit illustre cirurgià li explicà atentament el mecanisme, i que l'idea de suprimir la lligadura és també d'ell, si bé no la posà com regla, puix notà que, no lligant, s'observava, ja un traspuament sagnós d'origen venós, ja, en les dònnes molt atheromatoses, una petita hemorragia arterial.

Demostra després que l'hemostasi resulta en les operades den Tuffier molt incompleta: quan no hi ha traspuament vaginal roig, hi ha hemorragies que maten: una malalta no degué la salvació més que a una laparotomia feta dugues hores després de l'operació per l'intern, qui la trobà palida, quasi bé exsangüe i amb un pols filiforme, embegudes les cales vaginals de sang roja.

Analysa, per fi, alguns casos i posa de relleu la diferencia entre la descripció den Tuffier i la que n donà en Tessier en sa thesi i els errors comesos per amdós. Allà on, segons notes d'aquest, se treuen les cales empapades de sang roja i es troba sang liquida en la vagina i am l'especulum se veu brollar la sang en una extensió bastant ampla, essent la petita pelvis plena de glebes i sang liquida, no s'expliquen els symptomes d'hemorragia presentats per l'operada; i allà on se presenta xumament vaginal bastant intens i persistent durant tres dies, i en la pelvis se troba, colectat en mig d'adherencies, liquid rogenic, lleugerament terbol, ni hi veuen rastres d'hemorragia ni symptomes de peritoniti.

Am sa rèplica no sols ha restablert en Doyen sos drets, sinó que, escarbotant l'aparent brillantor del nou metode, n'ha demostrat la falsia.

Abans, com ara, ses idees triomphen.

QUERALTÓ

