

matic. En aquests casos se veu clarament dibuixar-se la silueta del diafragma entre dugues zones clares baix forma d'una cinta prima ondulada.

Els moviments respiratoris del muscle són molt modificats en l'emphysema: són menys extesos que en l'estat normal, i la disminució de l'excursió diafragmática és més gran pel costat del pulmó més atacat. En fi, en els emphysemes molt acusats el diafragma està situat més cap a baix en l'abdomen que en les condicions fisiològiques.

I.—TUBERCULOSI LATENT

Béclère, informant, examina primer la tuberculosi latent. Defineix així les lesions tuberculoses ocultes baix les apariències d'una perfecta salut i que no s' revelen per cap signe físic, com tampoc per cap desordre funcional.

És una noció corrent, ensenyada per tots els anatomo-patologistes desde Laennec, que la freqüència am que s' troba, en l'autopsia dels individus de tota edat morts d'afeccions varies o acomesos, en plena salut, de mort violenta, antics fogars de tuberculosi en via de transformació fibrosa o caseo-calcarea en els ganglis bronquials, el vertice dels pulmons, les pleures, sent així que durant la vida cap symptoma havia fet somniar en l'existència d'una afecció tuberculosa. Tots els agrupaments humans, criatures en els collegis, obrers en els tallers, detinguts en les presons, soldats en els quartels, contenen, doncs, en més o menys grau, nombre d'individus afectats de tuberculs latents i que, no obstant, presenten els signes habituals d'una excellent salut.

Més el nom de tuberculosi latent no solament deu aplicar-se a les lesions tuberculoses amagades baix l'aspecte exterior de la força i de la salut: s'aplica igualment als casos tant nombrosos aon la tuberculosi se dissimula baix la mascara de l'anèmia, de la chlorosi, de la dyspepsia, de la neurasthenia, sense que cap signe funcional dongui a coneixer les alteracions pulmonars al seu principi. En aquests diversos estats morbosos se pot suposar que l'examen radioscòpic revelarà lesions amagades més sovint encara que en els soldats joves, és a dir, més de dugues vegades per cinc, i que mostrarà aviat, baix el syndroma vulgar, sa causa específica; més hem de confessar que en aquest punt les observacions ens manquen.

Tard o d'hora, per demés, en els malalts d'aquesta categoria, una petita tós seca, l'expectoració d'alguns filaments de sang i dolors thoracics, d'un trastorn en la funció respiratoria. La tuberculosi no s' pot manifestar encara per cap de sos acostumats signes; però no mereix del tot que se l'anomeni latent, perquè és ja sospitada o al menys temuda, si ja no ho era al principi. Convé citar encara totes les formes agudes tant diverses d'empaig gástric, de febre synoca, de febre typhica, que revesteix la tisi granulica, sense que res cridi l'atenció sobre l'aparell respiratori. Si ns recordem de lo que alguns autors designen baix el