

nom de llei de Buhl, l'existència quasi constant d'antics fogars caseosos pulmonars, pleurals o ganglionaris en aquests casos de tuberculosi miliar aguda, és verossimil que l'examen radioscòpic podrà sovint ajudar a un diagnòstic sempre difícil; més, com per l'anèmia, la clorosi, la dispepsia i la neurasthenia simptomàtiques, no coneixem encara observacions provantes.

(Seguirà)

Traduït per E. VINTRÓ

## Analysis

### VULVA I VAGINA

S. ROUZMINE.—De les fistules vessico-vaginals; llur tractament.—  
(*Boln. gaz. Botkina*, 1898, n.º 3-4.)

L'autor ha recollit en l'hospital de Saratoff 44 casos de fistules entre 1,004 de gynecologia observats en aquest hospital desde 1889 a 1897. La freqüència és, doncs, de 4'36 p. o/o. Savastitzky i Neugebauer han cridat l'atenció sobre aquesta freqüència relativament considerable de les fistules vessico-vaginals a Rússia, lo que s'explica per causes locals (falta de llevadores a la montanya i al mateix temps a que les dones prenyades se dirigeixen molt rarament a la llevadora, preferint les dones practiques).

Segons l'edat de les malaltes, poden agrupar-se aixís aquests casos:

Dels 20 als 40 anys, 86'3 p. o/o.

Per sota dels 20 anys, 9 p. o/o.

De 40 anys per amunt, 4'5 p. o/o.

L'autor, considerant els resultats del tractament, divideix aquests casos en sis agrupaments: 1.<sup>er</sup> Curació després de la primera intervenció: 21 cas (47'74 p. o/o); 2.<sup>n</sup> Curació repetida l'intervenció: 3 casos (6'81 p. o/o); 3.<sup>er</sup> Curació després de la tercera intervenció: 3 casos; 4.<sup>t</sup> Millora per la disminució de la fistula: 8 casos (18'18 p. o/o); 5.<sup>t</sup> Sense millora: 8 casos; 6.<sup>e</sup> Perfecte resultat per l'episioleisis: 1 cas.

L'avivament se féu bastant extens, acostant-se les vores avivades en la direcció en que la tivantora era més petita. Dugues vegades ha sigut necessari tornar a obrir el meut, que estava tapat.

Les sutures se feren generalment am seda (rars vegades am fils de plata), traient els punts dels sis als vuit dies.

La sonda estava colocada en tots els casos permanentment 9 o 10 dies; després les malaltes se llevaren.

En la gran majoria d'aquests casos s'operà sense anèsthesia.

F. A. SAVINE.—Uter doble i vagina aparedada (atabicada).—(*La Gynecologie*, 1898.)

Se tracta d'una malalta que als 20 anys entrà a l'hospital queixant-se de forts dolors i perdues de sang molt marcades sempre que coabitava. Fins allavors havia estat bona i sana.