

sia l'ha feta benigna i la dilatació l'ha tornada facil» (1), i que, com ens assevera l Dr. Planellas (2), «realisa completament el *desideratum* de la therapeutica intra-uterina», se li han dirigit algunes objeccions que no tenen més fonament que l nom i l'autoritat científica dels objectants.

La més transcendental d'aquelles és la de que l curetatge de la cavitat uterina és causa d'esterilitat, lo qual és fals de tota falsetat anatomica, physiologica i clinicament.

Duvelius (3), en una serie d'experiments fets en cadavres frescos de dònnes que havien sofert el rasclament, ha notat que aquest, ben practicat, treu, a pesar de les afirmacions de L. M. Bossi (4), la totalitat de la mucosa, més no tota sa groixudaria, perquè ls tubos glandulars penetren entre ls feixos de la capa muscular, i els fons de sac d'aquells, junt amb una petita porció de corion, continuen adherits, incrustats, al parenchyma uteri a pesar dels raspats més energics, i aquells restos d'endometri són els que serveixen de punt de partida pera la renovació o regeneració integral de la membrana mucosa uterina. Se verifica aquí l mateix phenomen que en el part. El cirurgia, doncs, al practicar l'intervenció de que m'ocupo, reproduceix un dels accidents physiologics del part. L'operació de Récamier permet, doncs, la reproducció completa de l'endometri amb ausencia total de teixit cicatricial i d'adherencies pathologiques, com així ho ha comprovat Duvelius per l'examen microscopic en dos uters que havent sofert diversos rasclaments foren ablacionats per Martin.

La mucosa uterina està dotada d'un gran poder regenerador, provant-ho la menstruació i l'embraç, car en amdós estats una gran gruixaria o quasi la totalitat de la mateixa pot eliminar-se i esser restaurada rapidament. «El raspat provoca artificialment, amb un fi therapeutc, una muda, un cambi de la mucosa comparable al de la caduca; substitueix, com s'ha dit, una nova mucosa regenerada en un medi antiséptic, a una membrana infectada pels germens i que ha sofert modificacions profundes, la qual regressió seria de les més llargues i de les més

(1) *Thérapeutique chirurgicale*, 1892, pag. 939.

(2) Prolec a la traduc. espany. de la *Ginecologia* de Pozzi, pag. XX.

(3) *Zur Kenn. der Uterus* (*Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie*, Band X, Heft. 1).

(4) *Rapidité de reproduction de la muqueuse de l'utérus après le raclage* (*Arch. ital. de biol.* XXIV, pag. 51), i *Annali dell'ostetrica et ginec.*, Febrer 1895.